

Informe Epidemiológico

IMUNO- PREVENÍVEIS

**INFLUENZA
SAZONAL**



Informe Epidemiológico da Influenza Sazonal

Nº 31 -Ano 2024

Semana epidemiológica 01 a 37 do ano 2024

APRESENTAÇÃO

A vigilância da influenza no Brasil é composta pela vigilância sentinela de Síndrome Gripal (SG)* e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-hospitalizados) ** em pacientes hospitalizados e óbitos, além de surtos em instituições fechadas.

A vigilância conta com uma rede de unidades distribuídas no estado do Espírito Santo (ES) e tem como objetivo identificar os vírus respiratórios circulantes (com foco na influenza), identificar variações sazonais da influenza, prover cepas virais para formulação de vacinas de influenza, permitir o monitoramento da demanda de atendimento dos casos hospitalizados e óbitos para orientar na tomada de decisão e fornecer informações para o planejamento e adequação do tratamento.

Para tal são realizados atendimentos e coletas de exames de indivíduos com SG* e/ou SRAG**. Porém, diferente da COVID, nem todo paciente com SG por influenza ou outros vírus é notificada. As amostras coletadas para exames e notificadas de pacientes com SG* por influenza ou outros vírus são aleatórios e em unidades específicas, enquanto todos os pacientes com SRAG** deve ser notificada e coletado amostra para realização da transcrição reversa, seguida por cadeia da polimerase (RT-PCR) em tempo real (metodologia diagnóstica padrão – ouro para influenza).

O objetivo deste boletim é apresentar os dados de e SG* nas unidades sentinelas e SRAG – hospitalizados** e óbitos no Estado do ES com foco na influenza e assim favorecer o conhecimento oportuno do perfil sócio demográfico e epidemiológico de doenças respiratórias agudas e virais com potencial epidêmico – visando: gerar estudos epidemiológicos e orientar a tomada de decisões e demais ações de autoridades públicas para prevenção e controle da influenza e/ou outros vírus, reduzindo a morbimortalidade pela doença.

As informações apresentadas neste boletim são referentes ao período que compreende a semanas epidemiológica (SE) 37 de 2024, o que compreende casos com início de sintomas de 31/12/2023 a 14/09/2024.

*Definição de SG: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos.

**Definição de SRAG:

Indivíduo que apresente síndrome gripal associada a dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor ou igual que 94% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

Obs: Para efeito de notificação no SIVEP-GRIPE, devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização.

O sistema de informação oficial para notificação de casos e óbitos por SRAG e SG nas unidades sentinelas é o SIVEP GRIPE ([https:// sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/](https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/)).

As fichas são digitadas pelas vigilâncias epidemiológicas municipais, núcleos hospitalares de epidemiologia e Comissão de Controle de Infecção Hospitalar das unidades hospitalares das redes pública e privada

As SG só são notificadas nas unidades sentinelas específicas por amostragem. No Estado do Espírito atualmente consta com unidades sentinelas para SG localizadas na região Metropolitana e Central/ Norte do estado.

A meta é de 4 a 20 amostras de por SE para cada unidade sentinela.

As amostras são processadas no Laboratório Central do Espírito Santo (LACEN).

Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal (SG) (diagnóstico situacional)

Panorama geral das unidades sentinelas de síndromes gripais

Preconiza-se a coleta de 04 a 20 amostras semanais por unidade sentinela, sendo que até a SE 37 foram coletadas 1704 amostras no Estado do ES de SG (tabela 1).

O ideal é que as unidades sentinelas atuem com resultados de bom a excelente (acima de 4 coletas por semana epidemiológica), pois com esse indicador é possível conhecer os vírus circulantes no período e orientar medidas de prevenção e controle oportunamente.

Tabela 1. Número de coletas realizadas em casos de SGs segundo unidade sentinela até e na semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024, Espírito Santo.

	Coletas acumulada (SE 01 a 37)	Coleta semanal (SE 37)	Classificação da NT atual (SE 37)
Estratégia de Saúde da Família Bambe - Barra de São Francisco	39	0	SI
Pronto – Atendimento Monsenhor Neves Balestreiro - Cariacica	174	2	BAIXO
Pronto -Atendimento Municipal - Colatina	74	0	SI
Policlínica Municipal Dr Jose Carlos Hesbest – Santa Maria de Jetibá	32	1	BAIXO
Pronto -Atendimento- São Mateus	24	0	SI
Pronto - Atendimento de Castelândia - Serra	433	0	SI
Pronto – Atendimento da Glória - Vila Velha	658	12	EXCELENTE
Pronto - Atendimento Praia do Sua - Vitória	274	0	SI
Total	1704	15	

Observações:


- **Coleta acumulada** corresponde ao número total de coletas por unidade sentinelas até a semana epidemiológica 37 do ano de 2024. Detalhada no Anexo A.
- **Coleta semanal** corresponde ao número de coletas por unidade sentinelas na semana epidemiológica de início dos sintomas 37 do ano de 2024 até a data da extração dos dados.
- **Classificação da nota técnica do Ministério da Saúde Nº 13/2023-CGVDI/DIMU/SVSA/MS** atual onde: Nessa semana 0 amostra corresponde SI ; 1 a 3 amostras corresponde proporcionalmente a classificação baixo; **4 a 6 corresponde proporcionalmente a classificação bom**; **7 a 9 corresponde proporcionalmente a classificação muito bom** e **10 ou mais corresponde proporcionalmente a classificação excelente**.

Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Perfil epidemiológico dos casos

Das amostras coletadas até o momento do ano de 2024, **99,88% (1702/1704)** possuem resultados inseridos no sistema de informação e **31,81% (542/1704)** tiveram resultados positivos para vírus respiratórios, sendo **26,20% (142/542)** para SARS2, **20,48% (111/542)** para influenza A H3N2, **20,11% (109/542)** para influenza A não subtipado, **16,79% (91/542)** para vírus sincicial respiratório (VSR), **8,67% (47/542)** para influenza A H1N1, **2,03% (11/542)** para influenza B, **1,29% (7/542)** para influenza A não subtipável, **1,29% (7/542)** para influenza sem subtipagem, **0,92% (5/542)** para codeteccção de influenza A H3N2 e SARS2, **0,92% (5/542)** para rinovírus, **0,37% (2/542)** para codeteccção de influenza A H1N1 e SARS2, **0,37% (2/542)** para codeteccção de influenza A não subtipado e SARS2, **0,18% (1/542)** para codeteccção de influenza A H3N2 e VSR e **0,18% (1/542)** para coinfeccção de influenza A não subtipado e VSR e (figura 1).


Figura 1. Identificação dos vírus respiratórios em unidades sentinelas de síndrome gripal do Espírito Santo segundo a semana epidemiológica de início dos sintomas, 01 a 37 de 2024 (total = 542).



Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Entre a SE 35 a SE 37, observa – se predomínio da influenza A H3N2 e do SARS2 (figura 2).

Figura 2. Identificação dos vírus respiratórios em unidades sentinelas de síndrome gripal do Espírito Santo da semana epidemiológica de início dos sintomas 35 a 37 de 2024 (total = 7).




Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Na SE 37 houve identificação de vírus influenza nas unidades sentinelas em indivíduo de 18 a 59 anos de idade.

Até a SE 37 entre os indivíduos menores de 17 anos (faixa etária pediátrica) houve maior identificação do VSR e da influenza apesar de ter também casos do SARS2. Já nos maiores de 18 anos predominou a identificação do SARS2 e influenza, com aumento do VSR (figura 3).

Figura 3. Identificação dos vírus respiratórios em unidades sentinelas de síndrome gripal do Espírito Santo segundo faixa etária, da semana epidemiológica de início dos sintomas 01 a 37 de 2024 (total = 542).




*Positividade por faixa etária

Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

O sexo de maior coleta e, conseqüentemente, identificação de vírus foi o feminino (figura 4), que geralmente procura mais os serviços de saúde.

Figura 4. Representação dos casos de SGs segundo sexo nas unidades sentinelas até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024, Espírito Santo (total de coletas = 1704 e total de positividade = 542).



Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de agosto de setembro, sujeitas a alterações.

Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Panorama geral

Perfil epidemiológico dos casos


Até a SE 37 de 2024 foram notificados 3980 casos de SRAG, sendo 99,42% (3957/3980) com amostra processada e com resultados inseridos no sistema. Destes, 23,44% (933/3980) foram classificados para outros vírus, seguidos de 12,04% (479/3980) para influenza, 5,13% (204/3980) para SARS2 e 0,15% (6/3980) para outros agentes. Porém, em 2335 casos não foi possível identificar o agente sendo classificados como SRAG não especificada (58,67%) e 0,58% (23/3980) dos casos estão sem classificação ainda (figura 5).

Entre os outros vírus respiratórios pesquisados cita – se VSR, bocavírus, rinovírus, metapneumovírus,

parainfluenza e adenovírus. 97,75% (912/933) dos casos classificados como SRAG por outros vírus foi identificado o VSR – importante ressaltar que o diagnóstico para este vírus é um diferencial desenvolvido dentro da vigilância da influenza, não existindo vigilância específica para estes casos e nem todas as amostras são submetidas ao painel viral mais ampliado (figura 5).


A maioria dos casos classificados de SRAG até o momento (94,87 % ou 3754/3957) foram baseados em critério laboratorial, principalmente pelo RT –PCR que corresponde a metodologia padrão – ouro para diagnóstico de vírus respiratórios incluindo a influenza. Desses, apenas 1,97% (74/3754) dos casos de SRAG foram classificados por critério laboratorial através de teste de antígeno. **Tal fato é importante pois, vigilância de vírus respiratórios de importância em saúde pública é uma vigilância de base de diagnóstico laboratorial, sendo considerado como indicador de qualidade dos casos e/ou óbitos por SRAG, quando pelo menos 70% de todos os casos e/ou óbitos notificados, no SIVEP-Gripe, tenham resultado de diagnóstico pela técnica padrão ouro, que é o RT-PCR em tempo real, como base para a classificação final do caso e/ou óbito segundo o Ministério da saúde.**

Figura 5. Casos SRAG hospitalizados segundo agente etiológico até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024, Espírito Santo (total = 3957).



Entre as SE 35 a SE 37 houve predomínio principalmente de SRAG não especificada, por SARS2 e por influenza (A H3N2 e B) (figura 6).

Figura 6. Casos SRAG hospitalizados segundo agente etiológico da semana epidemiológica do início dos sintomas 35 a 37 do ano de 2024, Espírito Santo (total = 153).




Observação: Excluído os casos em investigação.

Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024.

Esses casos de SRAG das últimas semanas tem ocorrido principalmente nos menores de 4 anos e maiores de 60 anos, grupos com risco de complicações para quadros respiratórios (figura 7).

Figura 7. Casos SRAG hospitalizados segundo a faixa etária até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024, Espírito Santo (total = 3957).




Observação: Excluído os casos em investigação.

Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024.

Entre os indivíduos menores de quatro anos de idade (faixa etária pediátrica) apesar de ter casos de SARS2, o VSR (outros vírus) é de fato o vírus mais predominante até SE 37. Enquanto nos maiores de 60 anos há distribuição dos diferentes vírus circulantes (figura 8).

Figura 8. Distribuição dos vírus identificados dos casos de SRAG hospitalizados segundo faixa etária até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024, Espírito Santo (total = 3957).




Influenza

O coeficiente de hospitalização de casos de SRAG por influenza no ano 2024 no estado do ES até o momento é de 12,00/100.000 habitantes.

Dentre os casos de SRAG por influenza, 36,12% (173/479) são por influenza A não subtipados, 25,68% (123/479) por influenza A H3N2, 14,61% (70/479) são por influenza A H1N1, 11,48% (55/479) por influenza ainda sem tipagem, 3,34% (16/479) por influenza A não subtipável, 2,92% (14/479) por influenza B, 0,63% (3/479) por influenza A H1N1 combinado com VSR, 0,21% (1/479) por influenza A H1N1 combinado com SARS2, 0,84% (4/479) por influenza A H3N2 combinado com VSR, 1,04% (5/479) por influenza A H3N2 combinado com SARS2, 2,09% (10/479) por influenza A não subtipado combinado com VSR, 0,21% (1/479) por influenza A não subtipado combinado com rinovírus, 0,42% (2/479) por influenza A não subtipados combinado com SARS2, 0,21% (1/479) por influenza A não subtipado combinado com rinovírus e adenovírus e 0,21% (1/479) por influenza sem tipagem combinado com SARS2 (figura 5).

Os casos de SRAG por influenza foram em indivíduos de 0 a 4 anos (34,24% ou 164/479), 5 a 11 anos (23,38% ou 112/479), 12 a 17 anos (10,02% ou 48/479), 18 a 59 anos (11,69% ou 56/479) e maiores de 60 anos (20,67% ou 99/479) (figura 9 e tabela 2).

Figura 9. Casos de SRAG hospitalizados por influenza segundo faixa etária até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024. Espírito Santo (total = 479).



Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Dentre os casos de SRAG por influenza, 74,94% (359/479) apresentaram pelo menos um fator de risco (idade e \ou presença de comorbidade para complicações de influenza, mostrando o impacto da infecção por influenza nos grupos de riscos (tabela 2).


Tabela 2. Distribuição dos casos de SRAG hospitalizados por influenza segundo a presença ou não de fatores de risco para infecção por influenza (faixa etária e presença de comorbidade) até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024, Espírito Santo (total = 479)

	Casos	%
Indivíduos de idade 0 a 4 anos	164	34,24
Indivíduos de idade igual ou maior que 60 anos	99	20,67
Indivíduos de idade 5 a 59 anos com fator de risco*	96	20,04
Indivíduos de idade 5 - 59 anos sem fator de risco*	120	25,05
	479	100,00

*fatores de risco: gestante, cardiopatia, pneumopatia crônica, diabetes melitos, doença neurológica, imunodepressão, doença renal crônica e obesidade) Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Em relação ao sexo, dos casos de SRAG por influenza 44,00% (210/479) e 56,00% (269/479) são, respectivamente, dos sexos feminino e masculino (figura 10).

Figura 10. Casos de SRAG hospitalizados por influenza segundo sexo até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024. Espírito Santo (total = 479).



Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

No que refere ao antiviral, dos casos de SRAG por influenza foi observado que apenas 14,00% (69/479) fizeram uso do antiviral (oseltamivir), enquanto 23,00% (110/479) não o usaram e 63,00% (300/479) não tinha essa informação preenchida na ficha de notificação (figura 11). Está indicado o uso de antiviral para todos os casos graves, uma vez que esse interfere na evolução da doença.


Figura 11. Casos de SRAG hospitalizados por influenza segundo uso do antiviral (oseltamivir) até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024. Espírito Santo (total = 479)



Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Em relação à distribuição geográfica onde os indivíduos residem dos casos de SRAG por influenza: 87,27% (418/479) eram da região metropolitana, 3,76% (18/479) da região sul e 8,14% (39/479) da região Central - Norte. 0,84% (4/479) eram moradores de fora do estado. (figura 12 e Detalhado no Anexo B).


Figura 12. Casos de SRAG hospitalizados por influenza até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024. Espírito Santo (total = 479).



Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Em se tratando da vacinação, apesar da ampliação da vacinação contra influenza para todas as faixas etárias independente da presença ou não de fatores de riscos no ano de 2023, entre os casos de SRAG por influenza apenas 35,00% (167/479) tinha registro de vacinação contra influenza no último ano no sistema vacina e confia ou na ficha de notificação antes de adoecer. Demais casos (65,00% ou 312/479) não tinham registro ou eram menores de 6 meses (figura 13).

Figura 13. Casos de SRAG hospitalizados por influenza até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024 segundo status de vacinação contra influenza no último ano. Espírito Santo (total = 479).



Fonte: Vacina e confia. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.


Perfil epidemiológico dos óbitos

Panorama geral

Até a semana epidemiológica 37 de 2024 foram notificados 227 óbitos por SRAG, o que corresponde 5,70% (227/3980) do total de casos. Contudo, 13,64% (543/3980) estão em aberto o desfecho. Do total de óbitos notificados, até o momento 42 foram óbitos (18,50% ou 42/227) encerrados como SRAG por influenza, sendo 26,19% (11/42) por influenza sem tipagem, 33,33% (14/42) por influenza A não subtipados, 16,67% (7/42) por influenza A H1N1, 19,05% (8/42) por influenza A H3N2 e 2,38% (1/42) por influenza A não subtipados combinado com SARS2 (figura 14).

Os demais óbitos foram encerrados das seguintes formas: 10,57% (24/227) por SARS2, 7,49% (17/227) por outros vírus (VSR, adenovírus e coinfeção rinovírus e parainfluenza 1) e 1,32% (3/227) por outros agentes. 141 casos não foram possível identificar o agente sendo classificados como SRAG óbitos não especificada (62,11%).

Figura 14. Óbitos SRAG hospitalizados segundo agente etiológico por e até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024, Espírito Santo (total = 227).




Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Entre as SE 33 a SE 35 houve predomínio de óbitos por SRAG não especificada e por SARS2 (figura 14).


Esses óbitos por SRAG vem ocorrendo predominantemente em indivíduos de 18 a 59 anos e em maiores de 60 (figura 15), como nas demais semanas epidemiológicas do ano (figura 16).

Figura 15. Óbitos SRAG hospitalizados segundo faixa etária até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024. Espírito Santo (total = 227).



Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Figura 16. Distribuição dos vírus identificados dos óbitos de SRAG hospitalizados segundo faixa etária até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024, Espírito Santo (total = 227).



Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Influenza

A maioria dos indivíduos que evoluíram para a óbito com SRAG por influenza tinham comorbidade ou fatores de risco para complicações de influenza (tabela 3).

Tabela 3. Distribuição dos óbitos de SRAG hospitalizados por influenza segundo faixa etária, fatores de risco e uso de antiviral até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024, Espírito Santo (total = 42)

	Óbitos	%	Fez uso de antiviral		Não fez uso		Sem a informação	
				%		%		%
Indivíduos de 0 a 4 anos de idade	1	2,38	1	2,38	0	0,00	0	0,00
Indivíduos de idade maior ou igual 60 anos	27	64,29	5	14,29	19	45,24	2	4,76
Indivíduos de 5 a 59 anos de idade com pelo menos um fator de risco	11	26,19	1	2,38	7	16,67	3	7,14
Indivíduos de 5 a 59 anos de idade sem fator de risco	3	7,14	0	0	3	7,14	0	0,00
	42	100,00	7	19,05	29	69,05	5	11,90

Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alteração.

*fatores de risco: gestante, cardiopatia, pneumopatia crônica, diabetes melitos, doença neurológica, imunodepressão, doença renal crônica e obesidade).

Em relação ao sexo, dos casos de SRAG por influenza que evoluíram para óbito 50,00% (21/42) eram do sexo feminino e 50,00% (21/42) eram do sexo masculino.

No que compete ao antiviral, nos óbitos de SRAG por influenza foi observado que apenas 7 dos 41 óbitos tinha descrição do uso do fosfato de oseltamivir (19,05%) (tabela 3). Demais óbitos não tinham essa informação preenchida ou não havia usado o fosfato de oseltamivir. Sabidamente está indicado o uso de antiviral para todos os casos graves, uma vez que esse interfere na evolução do doente (tabela 3).

Em relação à distribuição geográfica, 73,81% (31/42) tratavam – se de moradores da região metropolitana, enquanto 9,52% (4/42) eram moradores da região Sul e 11,90% (5/42) eram moradores da região Central - Norte. 2 dos óbitos (2/42 ou 4,76%) moravam fora do estado, mas foram a óbito na hospitalização aqui no estado (Detalhado no Anexo B).

Em se tratando da vacinação apesar da ampliação da vacinação contra influenza na rede pública independente da presença ou não de fatores de riscos no último ano, dos indivíduos que foram a óbito até o momento apenas 16 (39,00% ou 16/42) tinham a vacina contra influenza do último ano. Demais (26/42 ou 61,00%) não tinham registro da vacina da influenza no último ano no vacina e confia ou na ficha de notificação.

Algumas considerações:

As SG são doenças endêmicas, que ocorrem geralmente no período de outono e inverno, sendo na maioria das vezes de caráter auto - limitadas. No entanto, em algumas situações podem evoluir para gravidade (SRAG) evoluindo com complicações, hospitalizações e mortes - principalmente na presença de fatores de risco tais como: puérpera, síndrome de down, doença renal crônica, pneumopatia crônica e obesidade como se observa nesse informe.

Hoje o Sistema Único de Saúde (SUS) oferta algumas vacinas para grupos de riscos que protegem contra alguns tipos de SRAG, dentre as quais as causadas por influenza e SARS2.

Os vírus influenza, VSR e SARS2 estão circulando no estado inclusive com casos grave e óbitos.

Diante do que foi exposto se faz necessário reforçar as medidas de prevenção, tratamento e controle da influenza para evitarmos o aumento de casos de SRAG por influenza, e conseqüentemente os óbitos. Além

de sensibilizarmos a importância do trabalho das vigilâncias da influenza já que elas auxiliam no entendimento das circulações virais visando produção de imunobiológicos (vacinas).

Ações propostas

- Manutenção das estratégias de vacinação para melhoria da cobertura vacinal de COVID e influenza, e outros imunobiológicos disponíveis que protegem contra doenças respiratórias (continuamente).
- Fortalecimento das unidades sentinelas visando a reestruturação e detecção dos problemas operacionais visando o alcance e manutenção da meta preconizada das coletas das amostras de SG (continuamente).
- Fortalecimento das vigilâncias de influenza e capacitação (continuamente)
- Manutenção desse boletim da influenza.
- Orientação das vigilâncias municipais e hospitalares para a notificação, a digitação e alimentação do sistema SIVEP – GRIPE dos casos de SRAG e de SG das unidades sentinelas (continuamente).
- Orientação aos profissionais de saúde prescritores quanto a importância do uso do oseltamivir para o desfecho do indivíduo com fator de risco para influenza.

Recomendações

- Aos gestores, as vigilâncias de influenza e aos núcleos de vigilância hospitalar: disseminar aos serviços de saúde públicos e privados o Protocolo de Tratamento de Influenza-2023, com ênfase no tratamento oportuno dos casos de SRAG e de SG com condições e fatores de risco;
- Aos gestores, as vigilâncias de influenza, aos núcleos de vigilância hospitalar, aos serviços de assistências a saúde e a população geral: divulgar amplamente à população as medidas preventivas contra a transmissão do vírus influenza e informações sobre a doença, com a orientação de busca de atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis.
- Aos serviços assistências a saúde (atenção primária, secundária e terciária): tratar oportunamente todos os casos suspeitos para influenza independente de coleta ou resultado laboratorial conforme indicação do Protocolo de Tratamento de Influenza-2023;
- As vigilâncias e serviços assistências a saúde: notificar os casos e óbitos que atendam a definição de caso de SRAG no sistema de informação SIVEP-GRIPE.
- As vigilâncias: digitar oportunamente o caso, a investigação e o desfecho dos casos no SIVEP – GRIPE.
- A população: manutenção das medidas de prevenção visando a prevenção da infecção por influenza. Tais como a vacinação contra a influenza, etiqueta respiratória, higiene das mãos, limpeza e desinfecção de objetos e ambientes, evitar ambientes fechados e aglomerados e isolamento em casos de sintomas respiratórios.

Anexo A

Tabela 4. Distribuição das coletas realizadas em casos de SGs por unidade sentinela segundo a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024, Espírito Santo. (total de coletas = 1704).

	Estratégia de Saúde da Família Bambe - Barra de São Francisco	Pronto - Atendimento Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro-Cariacica	Pronto - Atendimento Colatina	Pronto - Atendimento São Mateus	Pronto - atendimento de Castelândia - Serra	Pronto - Atendimento da Glória - Vila Velha	Pronto - Atendimento o Praia do Sua - Vitória	Policlínica Municipal Dr Jose Carlos Hesbest - Santa Maria de Jetibá
SE 01	0	6	1	0	2	11	7	0
SE 02	0	3	0	0	2	15	5	0
SE 03	0	2	3	4	0	20	7	0
SE 04	0	1	0	1	0	25	1	0
SE 05	0	1	2	4	1	23	2	0
SE 06	0	4	5	0	8	30	3	0
SE 07	6	6	7	0	9	26	7	0
SE 08	2	14	3	2	7	17	13	0
SE 09	2	12	3	0	17	17	6	0
SE 10	5	34	1	1	18	4	8	0
SE 11	9	28	2	5	24	10	13	0
SE 12	2	14	0	2	25	9	3	0
SE 13	3	7	0	1	10	26	7	0
SE14	1	6	0	0	20	11	11	0
SE 15	0	11	0	0	19	18	13	0
SE 16	4	4	0	2	14	22	7	0
SE 17	2	2	0	0	20	23	17	0
SE 18	2	1	0	0	21	20	7	0
SE 19	1	2	0	0	14	11	4	0
SE 20	0	2	0	0	16	24	2	0
SE 21	0	2	0	1	7	12	9	0
SE 22	0	0	0	0	20	12	6	0
SE 23	0	0	0	0	13	10	14	0
SE 24	0	2	0	0	12	16	3	0
SE 25	0	1	0	0	14	10	1	0
SE 26	0	0	2	0	15	16	3	3
SE 27	0	1	7	0	15	14	7	4
SE 28	0	1	7	0	12	17	13	3
SE 29	0	0	1	0	7	17	11	4

SE 30	0	0	6	0	8	13	12	3
SE 31	0	2	6	0	14	21	10	1
SE 32	0	2	4	0	9	19	10	2
SE 33	0	0	4	1	12	30	8	6
SE 34	0	0	9	0	14	20	14	2
SE 35	0	0	1	0	10	25	25	3
SE 36	0	1	0	0	4	28	28	0
SE 37	0	2	0	0	0	12	12	1
	39	174	74	24	433	658	274	32

Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Anexo B

Tabela 5. Distribuição dos casos de SRAG por influenza até a semana epidemiológica do início dos sintomas 37 do ano de 2024 segundo o município residente, Espírito Santo (total casos = 479 e total de óbitos = 42).

	<i>Município</i>	<i>Casos</i>	<i>%</i>	<i>Óbitos</i>	<i>%</i>
	Aracruz	3	0,63	1	2,38
	Afonso Cláudio	1	0,21	0	0,00
	Brejetuba	1	0,21	0	0,00
	Cariacica	67	13,99	5	11,90
	Domingos Martins	2	0,42	0	0,00
	Fundão	1	0,21	0	0,00
	Guarapari	31	6,47	1	2,38
	Ibatiba	3	0,63	0	0,00
	Ibiraçu	1	0,21	0	0,00
	Marechal Floriano	6	1,25	1	2,38
	Santa Maria de Jetibá	1	0,21	0	0,00
<i>Região metropolitana</i>	Serra	61	12,73	10	23,81
	Venda Nova	2	0,42	0	0,00
	Viana	17	3,55	0	0,00
	Vila Velha	170	35,49	2	4,76
	Vitória	50	10,44	10	23,81
		418	87,27	31	73,81
<i>Região Sul</i>	Cachoeiro	6	1,25	1	2,38
	Muqui	1	0,21	0	0,00
	Marataízes	2	0,42	1	2,38
	Presidente Kennedy	2	0,42	0	0,00
	Anchieta	1	0,21	0	0,00
	Vargem Alta	1	0,21	0	0,00
	Itapemirim	2	0,42	1	2,38
	São José do Calçado	2	0,42	1	2,38
	Bom Jesus do Norte	1	0,21	0	0,00
		18	3,76	4	9,52
	Água do Norte	1	0,21	0	0,00
<i>Região Central - Norte</i>	São Mateus	13	2,71	2	4,76

Boa Esperança	1	0,21	0	0,00
Nova Venécia	4	0,84	0	0,00
Colatina	6	1,25	1	2,38
Pedro Canário	2	0,42	0	0,00
Jaguaré	3	0,63	0	0,00
Ponto Belo	1	0,21	0	0,00
Linhares	3	0,63	1	2,38
Barra de São Francisco	2	0,42	0	0,00
Ecoporanga	2	0,42	1	2,38
Conceição da Barra	1	0,21	0	0,00
	39	8,14	5	11,90
Fora	4	0,84	2	4,76
Total	479	100,00	42	100,00

Fonte: SIVEP GRIPE. Dados extraídos em: 20 de setembro de 2024, sujeitas a alterações.

Referência Técnica Estadual da Vigilância das Meningites e da Influenza

Mariana Ribeiro Macedo

**Coordenação Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças
Imunopreveníveis**

Danielle Grillo Pacheco Lyra

Chefe do núcleo especial de Vigilância em Saúde

Fabiana Marques Dias e Silva

Gerência de Vigilância em Saúde

Juliano Mosa Mação

Subsecretaria de Vigilância em Saúde

Orlei Amaral Cardos

Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo

Miguel Paulo Duarte Neto

