## CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO





## ESQUEMA DE VACINAÇÃO DA GESTANTE

## Versão Janeiro, 2024

ESQUEMA DE VACINAÇÃO DA GESTANTE													ianeiro, 2024		
VACINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	N° DE DOSES		ESQUEMA	INÍCIO DA VACINAÇÃO		INTERVALO ENTRE AS DOSES		DOSAGEM	VIA DE	LOCAL DE	AGULHA HIPODÉRMICA	TEMPO DE VALIDADE APÓS	PRINCIPAIS
			VACINAÇÃO BÁSICA	REVACINAÇÃO OU REFORÇO	VACINAL	MÍNIMA	MÁXIMA	RECOMENDADO	MÍNIMO	DUSAGEM	ADMINISTRAÇÃO	APLICAÇÃO	RECOMENDADA	ABERTURA DO FRASCO	EVENTOS ADVERSOS
HEPATITE B (HB) Recombinante	Hepatite B	Partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície	3 doses	-	D1: 0 (zero), D2: 1 mês após a D1 e D3: 6 meses após a D1	-	Sem limite de idade	D2 1 mês após D1 e D3 6 meses após D1	D3 2 meses após D2, desde que D3 no mínimo 4 meses após D1.	até 19 anos e 1 ml a partir dos 20 anos LG:0,5ml até 15	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	Butantan: 15 dias - Butantan/ LG: 10 dias/ Serum: 28 dias	Dor, enduração, rubor, abscessos locais e manifestações sistêmicas
DIFTERIA, TÉTANO (dT) E/OU dTpa	dT:Difteria e Tétano dTpa:Difteria, Tétano e Coqueluche	Toxoides diftérico e tetânico Toxoides diftérico, tetânico combinada com Bordetela pertussis	dT: 3 doses dTpa: 1 dose	1 dose de dTpa a cada gestação	D1, D2, D3 ou Ref	dT: 7 anos dTpa: 20ª semana de gestação	dT: sem limite de idade dTpa: até 45 dias após o parto	dT: 60 dias dTpa: a cada gestação	dT: 30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana		dTpa -	cefaléia, sonolência, vômito e linfanodomegalia, reações de
COVID-19: Pfizer	Prevenção das complicações causadas pela COVID-21	RNA mensageiro	2 doses	A cada 6 meses	D1, D2 e Ref		Sem limite de idade	4 semanas entre D1 e D2 e reforço semestral	6 meses entre D2 e o reforço, e também entre reforços	0,3ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	12 horas	Reações locais. Vômito, diarréia, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, febre.