

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO



Governo do Estado do Espírito Santo



ESQUEMA DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE - 11 a 19 anos

Versão Julho, 2024

VACINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	Nº DE DOSES		ESQUEMA VACINAL	INÍCIO DA VACINAÇÃO		INTERVALO ENTRE AS DOSES		DOSAGEM	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	LOCAL DE APLICAÇÃO	AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA	TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO	PRINCIPAIS EVENTOS ADVERSOS
			VACINAÇÃO BÁSICA	REVACINAÇÃO OU REFORÇO		MÍNIMA	MÁXIMA	RECOMENDADO	MÍNIMO						
HPV	Infecções pelo Papilomavírus Humano (Câncer de colo de útero, garganta, boca, pênis e ânus)	Proteína L1 do HPV 6, 11, 16 e 18 Engenharia genética	1 dose	-	D1	9 anos	14 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	Uso imediato	Reações locais, cefaléia, febre, síncope, reações de hipersensibilidade
HEPATITE B (HB) Recombinante	Hepatite B	Partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície	3 doses	-	D1: 0 (zero), D2: 1 mês após a D1 e D3: 6 meses após a D1	-	Sem limite de idade	D2 1 mês após D1 e D3 6 meses após D1	D3 2 meses após D2, desde que D3 no mínimo 4 meses após D1.	Butantan e Serum: 0,5 ml até 19 anos e 1 ml a partir dos 20 anos LG: 0,5ml até 15 anos e 1 ml a partir de 16 anos	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	Butantan: 15 dias - Butantan/ LG: 10 dias/ Serum: 28 dias	Dor, endurecimento, rubor, abscessos locais e manifestações sistêmicas
DIFTERIA, TÉTANO (dT)	Difteria e Tétano	Toxoides diftérico e tetânico	3 doses	A cada 10 anos 5 anos em caso de ferimentos graves	D1, D2, D3 ou Ref	7 anos	Sem limite de idade	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	Butantan: 15 dias - Serum/Intervalo/Biological/Biofarma: 4 semanas	Reações locais, nódulos, febre, cefaléia, sonolência, vômito e linfadenomegalia, reações de hipersensibilidade e manifestações neurológicas.
SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA (SCR)	Sarampo, Caxumba e Rubéola	Vírus vivo atenuado	2 doses	-	Não vacinados: D1 e 30 dias após D2. Esquema incompleto: D2 30 dias após D1.	-	59 anos, 11 meses e 29 dias	30 dias	30 dias	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região Deltoideana	13x4,5	Serum: 6h Fiocruz/ MSD: 8h (multidose) GSK: uso imediato	Reações locais, febre, cefaléia, exantema, linfadenopatia, encefalite, meningites, artralgia, artrite, púrpura trombocitopênica, parotidite, reações de hipersensibilidade, dentre outras.
FEBRE AMARELA (FA)	Febre Amarela	Vírus vivo atenuado	Dose única para adolescentes que receberam a vacina após 5 anos de idade.	Reforço para adolescentes que receberam a vacina antes dos 5 anos de idade.	Não vacinados: DU	-	59 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região Deltoideana	13x4,5	Fiocruz: 6 horas (multidose)	Reações locais, febre, mialgia, cefaléia, doença viscerotrópica aguda, doença neurológica aguda.
MENINGOCÓCICA ACWY Conjugada (MenACWY)	Doenças invasivas causadas pela Neisseria meningitidis dos sorogrupos A, C, W e Y.	Polissacarídeo concentrado de Neisseria meningitidis Sorogrupo A, C, W e Y Conjugado	1 dose	-	Dose ou Ref: 11 anos a 14 anos	11 anos	14 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	Uso imediato após preparo	Reações locais: dor, hiperemia, edema. Reações sistêmicas: febre, irritabilidade, sonolência, hiporexia, reações de hipersensibilidade dentre outras.