

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO



ESQUEMA DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE - 11 a 19 anos

Versão Dezembro, 2024

| VACINA | PROTEÇÃO CONTRA | COMPOSIÇÃO | Nº DE DOSES | | ESQUEMA VACINAL | INÍCIO DA VACINAÇÃO | | INTERVALO ENTRE AS DOSES | | DOSAGEM | VIA DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAL DE APLICAÇÃO | AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA | TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO | PRINCIPAIS EVENTOS ADVERSOS |
|--|---|---|---|---|--|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | VACINAÇÃO BÁSICA | REVACINAÇÃO OU REFORÇO | | MÍNIMA | MÁXIMA | RECOMENDADO | MÍNIMO | | | | | | |
| HPV | Infecções pelo Papilomavírus Humano (Câncer de colo de útero, garganta, boca, pênis e ânus) | Proteína L1 do HPV 6, 11, 16 e 18 Engenharia genética | 1 dose | - | D1 | 9 anos | 14 anos, 11 meses e 29 dias | - | - | 0,5 ml | Intramuscular (IM) | Região Deltaideana | 25x6 25x7 | Uso imediato | Reações locais, cefaléia, febre, síncope, reações de hipersensibilidade |
| HEPATITE B (HB) Recombinante | Hepatite B | Partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície | 3 doses | - | D1: 0 (zero), D2: 1 mês após a D1 e D3: 6 meses após a D1 | - | Sem limite de idade | D2 1 mês após D1 e D3 6 meses após D1 | D3 2 meses após D2, desde que D3 no mínimo 4 meses após D1. | Butantan e Serum: 0,5 ml até 19 anos e 1 ml a partir dos 20 anos LG: 0,5ml até 15 anos e 1 ml a partir de 16 anos | Intramuscular (IM) | Região Deltaideana | 25x6 25x7 | Butantan: 15 dias - Butantan/ LG: 10 dias - Serum: 28 dias - LG: 28 dias | Dor, endureção, rubor, abscessos locais e manifestações sistêmicas |
| DIFTERIA, TÉTANO (DT) | Difteria e Tétano | Toxoides diftérico e tetânico | 3 doses | A cada 10 anos 5 anos em caso de ferimentos graves | D1, D2, D3 ou Ref | 7 anos | Sem limite de idade | 60 dias | 30 dias | 0,5 ml | Intramuscular (IM) | Região Deltaideana | 25x6 25x7 | Butantan: 15 dias - Serum/Intervalo/Biofarm: 4 semanas | Reações locais, nódulos, febre, cefaléia, sonolência, vômito e linfadenomegalia, reações de hipersensibilidade e manifestações neurológicas. |
| SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA (SCR) | Sarampo, Caxumba e Rubéola | Vírus vivo atenuado | 2 doses | - | Não vacinados: D1 e 30 dias após D2. Esquema incompleto: D2 30 dias após D1. | - | 59 anos, 11 meses e 29 dias | 30 dias | 30 dias | 0,5 ml | Subcutânea (SC) | Região Deltaideana | 13x4,5 | Serum: 6h Fiocruz e MSD: 8h | Reações locais, febre, cefaléia, exantema, linfadenopatia, encefalite, meningites, artralgia, artrite, púrpura trombocitopênica, parotidite, reações de hipersensibilidade, dentre outras. |
| FEBRE AMARELA (FA) | Febre Amarela | Vírus vivo atenuado | Dose única para adolescentes que receberam a vacina após 5 anos de idade. | Reforço para adolescentes que receberam a vacina antes dos 5 anos de idade. | Não vacinados: DU | - | 59 anos, 11 meses e 29 dias | - | - | 0,5 ml | Subcutânea (SC) | Região Deltaideana | 13x4,5 | Fiocruz: 6 horas (multidose) | Reações locais, febre, mialgia, cefaléia, doença viscerotrópica aguda, doença neurológica aguda. |
| MENINGOCÓCICA ACWY Conjugada (MenACWY) | Doenças invasivas causadas pela Neisseria meningitidis dos sorogrupos A, C, W e Y. | Polissacarídeo concentrado de Neisseria meningitidis Sorogrupos A, C, W e Y Conjugado | 1 dose | - | Dose ou Ref: 11 anos a 14 anos | 11 anos | 14 anos, 11 meses e 29 dias | - | - | 0,5 ml | Intramuscular (IM) | Região Deltaideana | 25x6 25x7 | Uso imediato após preparo | Reações locais: dor, hiperemia, edema. Reações sistêmicas: febre, irritabilidade, sonolência, hiporexia, reações de hipersensibilidade dentre outras. |