

ESQUEMA DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE - 11 a 19 anos														Versão FEVEREIRO 2026	
VACINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	Nº DE DOSES		ESQUEMA VACINAL	INÍCIO DA VACINAÇÃO		INTERVALO ENTRE AS DOSES		DOSAGEM	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	LOCAL DE APLICAÇÃO	AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA	TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO	PRINCIPAIS EVENTOS ADVERSOS
			VACINAÇÃO BÁSICA	REVACINAÇÃO OU REFORÇO		MÍNIMA	MÁXIMA	RECOMENDADO	MÍNIMO						
HPV	Infecções pelo Papilomavírus Humano (Câncer de colo de útero, garganta, boca, pênis e ânus)	Proteína L1 do HPV 6, 11, 16 e 18 Engenharia genética	1 dose	-	D1	9 anos	14 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltaideana	25x6 OU 25x7	Uso imediato	Reações locais, cefaleia, febre, síncope, reações de hipersensibilidade
HEPATITE B (HB) Recombinante	Hepatite B	Partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície	3 doses	-	D1: 0 (zero), D2: 1 mês após a D1 e D3: 6 meses após a D1	-	Sem limite de idade	D2 1 mês após D1 e D3 6 meses após D1	D3 2 meses após D2, desde que D3 no mínimo 4 meses após D1.	Butantan e Serum:0,5 ml até 19 anos e 1 ml a partir dos 20 anos LG:0,5ml até 15 anos e 1 ml a partir de 16 anos	Intramuscular (IM)	Região Deltaideana	25x6 OU 25x7	Butantan: 15 dias - Butantan/ LG: 10 dias- Serum: 28 dias-LG 28 dias	Dor, endureção, rubor, abscessos locais e manifestações sistêmicas
DIFTERIA, TÉTANO (dT)	Difteria e Tétano	Toxoides diftérico e tetânico	3 doses	A cada 10 anos 5 anos em caso de ferimentos graves	D1, D2, D3 ou Ref	7 anos	Sem limite de idade	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltaideana	25x6 OU 25x7	Butantan:15 dias - Serum/Interv ax/Biological/ Biofarma: 4 semanas	Reações locais, nódulos, febre, cefaleia, sonolência, vômito e linfandomegalia, reações de hipersensibilidade e manifestações neurológicas.
SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA (SCR)	Sarampo, Caxumba e Rubéola	Vírus vivo atenuado	2 doses	-	Não vacinados: D1 e 30 dias após D2. Esquema incompleto: D2 30 dias após D1.	-	59 anos, 11 meses e 29 dias	30 dias	30 dias	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região Deltaideana	13x4,5	Serum: 6h Fiocruz e MSD: 8h	Reações locais, febre, cefaleia, exantema, linfadenopatia, encefalite, meningites, artralgia, artrite, púrpura trombocitopênica, parotidite, reações de hipersensibilidade, dentre outras.
FEBRE AMARELA (FA)	Febre Amarela	Vírus vivo atenuado	Dose única para adolescentes que receberam a vacina após 5 anos de idade.	Reforço para adolescentes que receberam a vacina antes dos 5 anos de idade.	Não vacinados: DU	-	59 anos,11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região Deltaideana	13x4,5	Fiocruz: 6 horas (multidose)	Reações locais, febre, mialgia, cefaleia, doença viscerotrópica aguda, doença neurológica aguda.
MENINGOCÓCICA ACWY Conjugada (MenACWY)	Doenças invasivas causadas pela Neisseria meningitidis dos sorogrupos A,C,W e Y.	Polissacarídeo concentrado de Neisseria meningitidis Sorogrupos A, C, W e Y Conjugado		Dose ou reforço, conforme situação vacinal encontrada.	Dose ou Ref: 11 anos a 14 anos	11 anos	14 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltaideana	25x6 OU 25x7	Uso imediato após preparo	Reações locais: dor, hiperemia, edema. Reações sistêmicas: febre, irritabilidade, sonolência, hiporexia, reações de hierpensibilidade dentre outras.
DENGUE	Dengue	Sorotipo 1, 2, 3 e 4	02 doses		2 doses, com intervalo de 03 meses entre as doses.	10	14 anos, 11 meses e 29 dias	03 meses entre as doses.	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região Deltaideana	13 x 4,5	Uso imediato após preparo	Dor, vermelhidão e edema no local da injeção, cefaleia, mialgia, fadiga e astenia