

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO



## ESQUEMA DE VACINAÇÃO DE ROTINA DA CRIANÇA INDÍGENA - 0 a 10 anos

Versão Abril, 2025

| VACINA                                | PROTEÇÃO CONTRA                                                                  | COMPOSIÇÃO                                                                                                                                                                         | Nº DE DOSES      |                        | ESQUEMA VACINAL                                   | INÍCIO DA VACINAÇÃO                                   |                                                          | INTERVALO ENTRE AS DOSES   |                                                     | DOSAGEM                                                                | VIA DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAL DE APLICAÇÃO                            | AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA                            | TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO                                       | PRINCIPAIS EVENTOS ADVERSOS                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | VACINAÇÃO BÁSICA | REVACINAÇÃO OU REFORÇO |                                                   | MÍNIMA                                                | MÁXIMA                                                   | RECOMENDADO                | MÍNIMO                                              |                                                                        |                      |                                               |                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| BCG                                   | Formas graves da Tuberculose                                                     | Bactéria viva atenuada                                                                                                                                                             | Dose única       | -                      | Ao nascer                                         | Ao nascer                                             | 4 anos, 11 meses e 29 dias                               | -                          | -                                                   | FAP: 0,1 ml<br>Serum: Menor de 1 ano: 0,05 ml<br>Maior de 1 ano: 0,1ml | Intradérmica (ID)    | Inserção inferior do músculo deltóide direito | 13x3,8                                                    | 6 horas (multidose)                                                             | Reações locais e/ou regionais, granuloma, úlcera >1cm, abscesso quente, abscesso frio, linfadenopatias supurada e não supurada regionais, quelóide            |
| HEPATITE B (HB) Recombinante          | Hepatite B                                                                       | Partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície                                                                                                                               | Dose             | -                      | Ao nascer                                         | Ao nascer                                             | 30 dias                                                  | -                          | -                                                   | 0,5 ml                                                                 | Intramuscular (IM)   | Vasto lateral da coxa                         | 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos) | Butantan: 15 dias - Butantan/ LG: 10 dias- Serum: 28 dias- LG 28 dias           | Dor, endureção, rubor, abscessos locais e manifestações sistêmicas                                                                                            |
| POLIOMIELITE 1, 2 E 3 (VIP inativada) | Poliomielite                                                                     | Vírus inativado tipos 1, 2 e 3                                                                                                                                                     | 3 doses          | Reforço                | D1: 2 meses D2: 4 meses D3: 6 meses Ref. 15 meses | 2 meses                                               | 4 anos, 11 meses e 29 dias                               | Esquema primário: 60 dias. | Esquema primário: 30 dias. D3 para Reforço: 6 meses | 0,5 ml                                                                 | Intramuscular (IM)   | Vasto lateral da coxa                         | 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos) | 28 dias                                                                         | Eritema, endureção, dor, febre moderada, reação de hipersensibilidade (rara).                                                                                 |
| ROTAVÍRUS HUMANO G1P1 (VORH)          | Gastroenterite por Rotavírus                                                     | Vírus vivo atenuado                                                                                                                                                                | 2 doses          | -                      | D1: 2 meses D2: 4 meses                           | 1ª dose: 1 mês e 15 dias<br>2ª dose: 3 meses e 15dias | 1ª dose: 11 meses e 29 dias; 2ª dose: 23 meses e 29 dias | 60 dias                    | 30 dias                                             | 1,5 ml                                                                 | Oral                 | Cavidade oral                                 | -                                                         | Uso imediato                                                                    | Irritabilidade, vômito e diarreia moderados. Invaginação intestinal                                                                                           |
| DTP+Hib+HB (Penta)                    | Difteria, Tétano, Coqueluche, Infecções por Haemophilus Influenzae b, Hepatite B | Toxoides diftérico e tetânico, células inteiras inativadas de Bordetella pertussis, antígeno de superfície da hepatite B e oligossacarídeos conjugados de Haemophilus influenzae b | 3 doses          | -                      | D1: 2 meses D2: 4 meses D3: 6 meses               | 2 meses                                               | 6 anos, 11 meses e 29 dias                               | 60 dias                    | 30 dias                                             | 0,5 ml                                                                 | Intramuscular (IM)   | Vasto lateral da coxa                         | 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos) | Novartis, Serum, Panacea Biotec: Uso imediato após preparo. Biological: 28 dias | Reações locais, dor, abscessos frio e/ou quente, febre, sonolência, vômito, irritabilidade, choro persistente, EHH, convulsão e reações de hipersensibilidade |
| PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE (Pncc 10)     | Pneumonias, meningites, otites, sinusites pelos sorotipos que compõem a vacina   | Polissacarídeo capsular de 10 sorotipos do pneumococo (conjugada)                                                                                                                  | 2 doses          | 12 meses               | D1: 2 meses D2: 4 meses                           | 2 meses                                               | 4 anos, 11 meses e 29 dias                               | Esquema básico:60 dias     | Esquema básico: 30 dias, D2 para Ref: 60 dias       | 0,5 ml                                                                 | Intramuscular (IM)   | Vasto lateral da coxa                         | 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos) | Fiocruz: 28 dias Bio-manguinhos: uso imediato                                   | Reações locais, febre, irritabilidade, sonolência, perda de apetite, reações de hipersensibilidade                                                            |
| MENINGOCÓCICA C Conjugada (MncC)      | Doença sistêmica causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C              | Oligossacarídeo conjugado com a proteína CRM 197 de Corynebacterium diptheriae                                                                                                     | 2 doses          | 12 meses               | D1: 3 meses D2: 5 meses R: 12 meses               | 3 meses                                               | 4 anos, 11 meses e 29 dias                               | Esquema básico: 60 dias    | Esquema básico: 30 dias, D2 para Ref: 60 dias       | 0,5 ml                                                                 | Intramuscular (IM)   | Vasto lateral da coxa                         | 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos) | Uso imediato após preparo                                                       | Reações locais, febre, irritabilidade, sonolência, cefaléia, diarreia e vômito                                                                                |

|                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                     |          |                                              |                                                       |                                                         |                                                                  |                    |                                                                  |                                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COVID-19: Pfizer pediátrica para menor de 5 anos | Prevenção das complicações causadas pela COVID-19            | RNA mensageiro                                                                     | 3 dose                                                                                                                          | Reforço anual                    | D1, D2 e D3                                                                                                                         | 6 meses  | 4 anos, 11 meses e 29 dias                   | D1 para D2: 4 semanas e D2 para D3: 8 semanas         | -                                                       | 0,2 ml                                                           | Intramuscular (IM) | Vasto lateral da coxa ou região deltoideana, à depender da idade | 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos) 13x4,5 | 12 horas após diluição                                                | Reações locais, febre, mal estar, mialgia e reações de hipersensibilidade                                                                                                                  |
| COVID-19: XBB                                    | Prevenção das complicações causadas pela COVID-19            | RNA mensageiro                                                                     | 2 doses                                                                                                                         | Reforço anual                    | D1: 6 meses D2: 7 meses Reforço anual                                                                                               | 6 meses  | 4 anos, 11 meses e 29 dias (esquema básico). | 30 dias entre D1 e D2 vacina XBB em menores de 5 anos | -                                                       | 0,25 ml                                                          | Intramuscular (IM) | Menor de 2 anos: Vasto lateral da coxa                           | 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)        | 19 horas após diluição                                                | Reações locais, febre, mal estar, mialgia e reações de hipersensibilidade                                                                                                                  |
| INFLUENZA                                        | Prevenção das complicações causadas pelo vírus influenza     | Cepas do <i>Myxovirus influenzae</i> inativados, fragmentados e purificados        | D1 e D2 (primovacinado s menores de 9 anos); Vacinados anteriormente: reforço anual                                             | Reforço anual                    | D1: 6 meses D2: 7 meses Reforço anual                                                                                               | 6 meses  | Sem limite de idade                          | 30 dias entre D1 e D2                                 | 30 dias                                                 | De 6 meses a menores de 3 anos: 0,25ml<br>Acima de 3 anos: 0,5ml | Intramuscular (IM) | Menor de 2 anos: Vasto lateral da coxa                           | 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)        | 7 dias                                                                | Reações locais. Vômito, diarreia, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, febre.                                                                                                           |
| FEBRE AMARELA (FA)                               | Febre Amarela                                                | Vírus vivo atenuado                                                                | 2 doses                                                                                                                         | -                                | D1: 9 meses Ref: 4 anos                                                                                                             | 9 meses  | -                                            | -                                                     | -                                                       | 0,5 ml                                                           | Subcutânea (SC)    | Região Deltoideana                                               | 13x4,5                                                           | Fiocruz: 6 horas (multidose)                                          | Reações locais, febre, mialgia, cefaléia, doença viscerotrópica aguda, doença neurológica aguda.                                                                                           |
| SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA (SCR)                  | Sarampo, Caxumba e Rubéola                                   | Vírus vivo atenuado                                                                | 2 doses                                                                                                                         | -                                | D1: 12 meses D2: 15 meses                                                                                                           | 12 meses | 59 anos, 11 meses e 29 dias                  | 3 meses                                               | 30 dias                                                 | 0,5 ml                                                           | Subcutânea (SC)    | Região Deltoideana                                               | 13x4,5                                                           | Serum: 6h Fiocruz e MSD: 8h                                           | Reações locais, febre, cefaléia, exantema, linfadenopatia, encefalite, meningites, artralgia, artrite, púrpura trombocitopênica, parotidite, reações de hipersensibilidade, dentre outras. |
| HEPATITE A (HA)                                  | Hepatite A                                                   | Antígeno do vírus da hepatite A                                                    | Dose única                                                                                                                      | -                                | DU: 15 meses                                                                                                                        | 15 meses | 4 anos, 11 meses e 29 dias                   | -                                                     | -                                                       | 0,5 ml                                                           | Intramuscular (IM) | Vasto lateral da coxa                                            | 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)        | Uso imediato após preparo                                             | Reações locais, febre, diarreia, vômito e fadiga                                                                                                                                           |
| DIFTERIA, TÉTANO, PERTUSSIS (DTP)                | Difteria, Tétano e Coqueluche                                | Toxoides diftérico e tetânico, células inteiras inativadas de Bordetella pertussis | -                                                                                                                               | 1º Ref 15 meses<br>2º Ref 4 anos | 1º Ref 15 meses<br>2º Ref 4 anos                                                                                                    | 15 meses | 6 anos, 11 meses e 29 dias                   | 1º ref aos 15 meses 2º ref aos 4 anos                 | 1º ref 6 meses após 3ª dose, 2º ref 6 meses após 1º ref | 0,5 ml                                                           | Intramuscular (IM) | Vasto lateral da coxa ou deltóide                                | 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)        | Butantan: 15 dias - Serum e Biological: 28 dias - Biofarma: 4 semanas | Reações locais, febre, sonolência, vômito, irritabilidade, choro persistente, EHH, convulsão e reações de hipersensibilidade                                                               |
| VARICELA*                                        | Varicela                                                     | Vírus vivo atenuado                                                                | 2 doses                                                                                                                         | -                                | D1: 15 meses D2: 4 anos                                                                                                             | 9 meses  | 6 anos, 11 meses e 29 dias                   | -                                                     | 30 dias                                                 | 0,5 ml                                                           | Subcutânea (SC)    | Região Deltoideana                                               | 13x4,5                                                           | Uso imediato                                                          | Reações locais, febre, encefalite, ataxia, reações de hipersensibilidade                                                                                                                   |
| PNEUMOCÓCICA 23 VALENTE (Pneumo 23)              | Infecções invasivas pelo pneumococo nas populações indígenas | Polissacarídeo capsular de 23 sorotipos do pneumococo (conjugada)                  | 2 doses para população indígena <b>acima de 5 anos de idade sem comprovação vacinal com as vacinas pneumocócicas conjugadas</b> | -                                | D1: somente para população indígena acima de 5 anos de idade <b>sem comprovação vacinal com as vacinas pneumocócicas conjugadas</b> | 5 anos   | -                                            | -                                                     | -                                                       | 0,5 ml                                                           | Intramuscular (IM) | Região Deltoideana                                               | 25x6 25x7                                                        | Uso imediato                                                          | Febre (<38,9°C) e reações no local da injeção consistindo de dor, eritema, calor, inflamação e endurecimento local                                                                         |

|                       |                                                       |                                                       |                                                                          |                                                     |                   |        |                             |         |         |        |                    |                    |           |                                                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------|---------|--------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIFTERIA, TÉTANO (dT) | Difteria e Tétano                                     | Toxoides diftérico e tetânico                         | Considerar doses anteriores do componente diftérico e tetânico (3 doses) | A cada 10 anos, 5 anos em caso de ferimentos graves | D1, D2, D3 ou Ref | 7 anos | Sem limite de idade         | 60 dias | 30 dias | 0,5 ml | Intramuscular (IM) | Região Deltoideana | 25x6 25x7 | Butantan:15 dias - Serum/Intervax/Biological/ Biofarma: 4 semanas | Reações locais, nódulos, febre, cefaléia, sonolência, vômito e linfanomegalia, reações de hipersensibilidade e manifestações neurológicas. |
| HPV                   | Câncer de colo de útero, garganta, boca, pênis e ânus | Proteína L1 do HPV 6, 11, 16 e 18 Engenharia genética | Dose única                                                               | -                                                   | Dose única        | 9 anos | 14 anos, 11 meses e 29 dias | -       | -       | 0,5 ml | Intramuscular (IM) | Região Deltoideana | 25x6 25x7 | Uso imediato                                                      | Reações locais, cefaléia, febre, síncope, reações de hipersensibilidade                                                                    |

\* **Vacina Varicela:** Indígenas a partir dos 7 (sete) anos de idade não vacinados ou sem comprovação vacinal ou sem história pregressa da doença, administrar 1 (uma) ou duas doses de vacina varicela (atenuada), a depender do laboratório produtor.