

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

ESQUEMA DE VACINAÇÃO DO ADULTO - 20 a 59 anos

Versão Abril 2022

VACINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	Nº DE DOSES		ESQUEMA VACINAL	INÍCIO DA VACINAÇÃO		INTERVALO ENTRE AS DOSES		DOSAGEM	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	LOCAL DE APLICAÇÃO	AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA	TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO	PRINCIPAIS EVENTOS ADVERSOS
			VACINAÇÃO BÁSICA	REVACINAÇÃO OU REFORÇO		MÍNIMA	MÁXIMA	RECOMENDADO	MÍNIMO						
HEPATITE B (HB) Recombinante	Hepatite B	Partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície	3 doses	-	D1: 0 (zero), D2: 1 mês após a D1 e D3: 6 meses após a D1	-	Sem limite de idade	D2 1 mês após D1 e D3 6 meses após D1	D3 2 meses após D2, desde que D3 no mínimo 4 meses após D1.	Butantan e Serum: 0,5 ml até 19 anos e 1 ml a partir dos 20 anos LG: 0,5ml até 15 anos e 1 ml a partir de 16 anos	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	Butantan: 15 dias - Butantan/LG: 10 dias/ Serum: 28 dias	Dor, endureção, rubor, abscessos locais e manifestações sistêmicas
DIFTERIA, TÉTANO (dT)	Difteria e Tétano	Toxoides diftérico e tetânico	3 doses	A cada 10 anos 5 anos em caso de ferimentos graves	D1, D2, D3 ou Ref	-	Sem limite de idade	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	Butantan: 15 dias - Serum/Intervax/Biological/Biofarma: 4 semanas	Reações locais, nódulos, febre, cefaléia, sonolência, vômito e linfanodomegalia, reações de hipersensibilidade e manifestações neurológicas.
SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA (SCR)	Sarampo, Caxumba e Rubéola	Vírus vivo atenuado	2 doses (20 a 29 anos) 1 dose (30 a 59 anos)	-	20 a 29 anos - Não vacinados: D1 e 30 dias após D2. Esquema incompleto: D2 30 dias após D1. 30 a 59 anos - DU	-	59 anos, 11 meses e 29 dias	30 dias	30 dias	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região Deltoideana	13x4,5	Serum: 6h Fiocruz/ MSD: 8h (multidose) GSK: uso imediato	Reações locais, febre, cefaléia, exantema, linfadenopatia, encefalite, meningites, artralgia, artrite, púrpura trombocitopênica, parotidite, reações de hipersensibilidade, dentre outras.
FEBRE AMARELA (FA)	Febre Amarela	Vírus vivo atenuado	Dose única para pessoas que receberam a vacina após 5 anos de idade.	Reforço para pessoas que receberam a vacina antes dos 5 anos de idade.	Não vacinados: DU	-	59 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região Deltoideana	13x4,5	Fiocruz: 6 horas (multidose)	Reações locais, febre, mialgia, cefaléia, doença viscerotrópica aguda, doença neurológica aguda.
INFLUENZA (Campanhas)	Prevenção de complicações por influenza	Antígenos contra 3 cepas de influenza A(H1N1), A(H3N2) e B. Fragmentos de vírus inativados e purificados	Dose única	Anual	DU	-	Sem limite de idade	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM) ou Subcutânea (SC)	Região Deltoideana	25x6 25x7 13x4,5	Butantan: 7 dias	Reações locais, febre, mal estar, mialgia e reações de hipersensibilidade
COVID-19: Coronavac	Prevenção das complicações causadas pela COVID-19	Antígeno do vírus inativado	2 doses	4 meses após D2	D1, D2 e Ref	6 anos	Sem limite de idade	28 dias	14 dias	0,5ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	01 doses: uso imediato 10 doses: 8 horas	Reações locais. Enjoo, diarreia, dor muscular e nas articulações, calafrios, perda de apetite, tosse, coceira, coriza, congestão nasal.
COVID-19: Astrazeneca	Prevenção das complicações causadas pela COVID-20	Partículas virais de vetor adenovírus recombinante	2 doses	4 meses após D2	D1, D2 e Ref	18 anos	Sem limite de idade	8 semanas	28 dias	0,5ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	48 horas	Reações locais. Enjoo, dor de cabeça, dor de garganta, dor muscular ou nas articulações, calafrios, tosse, coriza, febre.
COVID-19: Pfizer	Prevenção das complicações causadas pela COVID-21	RNA mensageiro	2 doses	4 meses após D2	D1, D2 e Ref	12 anos	Sem limite de idade	8 semanas	21 dias	0,3ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	6 horas	Reações locais. Vômito, diarreia, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, febre.
COVID-19: Jansen	Prevenção das complicações causadas pela COVID-22	Vetor viral não replicante	1 dose	4 meses após D	Dose e Ref	18 anos	Sem limite de idade	-	-	0,5ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 25x7	6 horas	Reações locais. Enjoo, dor de cabeça, dor muscular ou nas articulações, cansaço, arrepios, tosse, coriza, febre.