



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

### SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 A 48 DE 2025 – DEZEMBRO 2025

#### **Apresentação:**

No Brasil, a vigilância dos vírus respiratórios de importância para a saúde pública é realizada por meio de uma Rede de Vigilância Sentinel de Síndrome Gripal (SG)\*, Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)\*\* em pacientes hospitalizados e/ou óbitos e Vigilância de SG suspeita de COVID\*\*\*. Essa rede é articulada com a Rede Laboratorial dos Vírus Respiratórios, composta pelos laboratórios centrais de saúde pública (LACENs) e laboratórios de referência nacionais (Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Adolfo Lutz e Instituto Evandro Chagas). Esses três laboratórios são credenciados na OMS como centros de referência para influenza (NIC, do inglês National Influenza Center), os quais fazem parte da rede global de vigilância da influenza e da COVID.

O objetivo deste informe é apresentar os dados de SG suspeita de COVID\*\*\*, de SG\* das unidades sentinelas e de SRAG – hospitalizados\*\* e óbitos do Estado do Espírito Santo (ES). Pretende-se favorecer o conhecimento oportuno do perfil sociodemográfico e epidemiológico das doenças respiratórias agudas e virais com potencial epidêmico, visando: gerar estudos epidemiológicos, orientar a tomada de decisões e apoiar ações das autoridades públicas para a prevenção e controle da influenza, COVID e/ou de outros vírus, contribuindo para a redução da morbimortalidade pela doença.

\*SG em unidades sentinelas: Indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e com início dos sintomas nos últimos 7 dias.

\*\*SRAG: Indivíduo com SG\* que apresente: dispneia/ desconforto respiratório, ou pressão ou dor persistente no tórax, ou saturação de O<sub>2</sub> menor ou igual a 94% em ar ambiente, ou coloração azulada (cianose) dos lábios ou do rosto. Consideram-se ainda óbitos por SRAG, independentemente de hospitalização.

\*\*\*SG suspeita de COVID: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

**Observação:** crianças: além dos itens anteriores, considerar-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico; idosos: considerar também critérios específicos de agravamento, como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. E, na suspeita de covid-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.




## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

### VIGILÂNCIA SÍNDROME GRIPAL (SG) SUSPEITA DE COVID


#### Panorama geral da COVID-19

**Figura 1 – Distribuição dos casos novos de COVID-19 por SE de início dos sintomas, até a SE 48, ES, 2025 (n = 6647)**



Fonte: Dados extraídos do e- SUS VS em 02 de dezembro de 2025\*SG considera-se a SE de primeiros sintomas. Dados sujeitos à alteração. \* Se 48 – considerar atraso de digitação de notificação.

**Figura 2 – Distribuição dos casos novos de COVID-19 por SE de início dos sintomas, até a SE 48, segundo faixa etária, ES, 2025 (n = 6647)**




Fonte: Dados extraídos do e- SUS VS em 02 de dezembro de 2025. \*SG considera-se a SE de primeiros sintomas Dados sujeitos à alteração. \* Se 48 – considerar atraso de digitação de notificação.



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais


Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

**Figura 3 – Distribuição dos óbitos de COVID-19 por SE de início dos sintomas, até a SE 48, ES, 2025 (n = 56)**



Fonte: Dados extraídos do e- SUS VS em 02 de dezembro de 2025. \*SG considera-se a SE de primeiros sintomas. Consideram óbitos e óbitos por outras causas. Dados sujeitos à alteração.

**Figura 4 – Distribuição dos óbitos de COVID-19 por SE de início dos sintomas, até a SE 48, segundo faixa etária, ES, 2025 (n = 56)**



Fonte: Dados extraídos do e- SUS VS em 02 de dezembro de 2025. \*SG considera-se a SE de primeiros sintomas. Consideram óbitos e óbitos por outras causas. Dados sujeitos à alteração.

Até a Semana Epidemiológica (SE) 48 de 2025, foram registrados 6647 casos de síndrome gripal (SG) por COVID-19, com 56 óbitos notificados no período (Figuras 1 e 3).



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

As maiores concentrações de casos foram registradas entre as SEs 7 a 11 e, posteriormente, a partir da SE 33 até a semana atual. A maioria desses casos ocorreu entre adultos de 18 a 59 anos e idosos com 60 anos ou mais. No entanto, também foram notificados casos inclusive com óbitos entre crianças e adolescentes, o que demonstra que a doença está presente em todas as faixas etárias, inclusive na população pediátrica (figura 2). Em relação aos óbitos, observou-se uma variação ao longo das semanas, com um pico expressivo na SE 5, principalmente entre os idosos com 60 anos ou mais (figura 4).


### Semanas Epidemiológicas 45 a 48 – SG suspeita de COVID-19

Entre as SEs 45 e 48, os casos de SG associados à COVID-19 permaneceram concentrados principalmente em adultos de 18 a 59 anos e em idosos com 60 anos ou mais, apresentando redução no total de registros. Contudo, observou-se um aumento expressivo de casos na faixa etária pediátrica. No mesmo período, foram confirmados óbitos por COVID-19 entre idosos.

## VIGILÂNCIA SENTINELA DE SÍNDROME GRIPAL (SG)

### Panorama Geral

**Figura 5 – Distribuição dos vírus respiratórios nas Unidades Sentinelas de SG, por SE de início de sintomas, até a SE 48, ES, 2025 (total = 911)**



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. \*SG considera-se a SE de primeiros sintomas. \*\*Segundo os relatórios da Fiocruz o subtipo da influenza B circulante é o Victoria. Dados sujeitos à alteração. C.=codetecção. \*\* Se 48 – considerar atraso de digitação de notificação.




## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

Nas unidades sentinelas de SG das amostras positivas para vírus respiratórios até a semana epidemiológica (SE) 48, observou-se que 28,21% (257/911) de rinovírus, 18,88% (172/911) de influenza A H1N1, 19,32% (176/911) de SARS-CoV-2, 10,43% (95/911) de vírus sincicial respiratório (VSR), 9,00% (82/911) de influenza A H3N2, 4,50% (41/911) de influenza B, 3,07% (28/911) de metapneumovírus, 1,54% (14/911) de influenza A não subtipado, 0,66% (6/911) de parainfluenza 3, 0,55% (5/911) de outros coronavírus (OC43 e NL63), 0,44% (4/911) de influenza sem subtipagem, 0,44% (4/911) de codetecção por rinovírus e VSR, 0,44% (4/911) de adenovírus, , 0,44% (4/911) de codetecção de SARS2-CoV e rinovírus, 0,33% (3/911) de codetecção por influenza A H1N1 e SARS-CoV-2, 0,22% (2/911) de enterovírus, 0,22% (2/911) de codetecção de rinovírus e metapneumovírus, 0,22% (2/911) de codetecção por influenza A H1N1 e VSR, 0,11% (1/911) de codetecção por rinovírus e enterovírus, 0,11% (1/911) de codetecção por rinovírus e adenovírus, 0,11% (1/911) de codetecção de SARS2-CoV e metapneumovírus e 0,11% (1/911) de codetecção de influenza A H3N2 e rinovírus (figura 5).

**Figura 6 - Distribuição dos vírus respiratórios em Unidades Sentinelas de SG, segundo faixa etária, até a SE 48, Espírito Santo, 2025 (total = 911)**



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. \*Para os dados de SG considera-se a SE de primeiros sintomas.

\*\*Segundo os relatórios da Fiocruz o subtipo da influenza B circulante é o Victoria. Dados sujeitos à alteração. C.=codetecção.

Até a SE 48, entre os indivíduos de 0 a 17 anos, observou-se predominância de outros vírus respiratórios, como VSR, rinovírus, metapneumovírus, adenovírus e enterovírus, correspondendo a 71,30% dos casos, seguida pela influenza (20,87%) e pelo SARS-CoV-2 (7,83%). Contudo, o número de amostras coletadas nessa faixa etária foi reduzido. Na faixa de 18 a 59 anos, os outros vírus foram o vírus mais prevalente (41,63%), seguida pela influenza (34,98%) e pelo SARS-CoV-2 (23,38%). Entre os idosos (60 anos ou mais),



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais


Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

a influenza apresentou maior predominância (43,33%), seguida por outros vírus respiratórios (38,52%) e pelo SARS-CoV-2 (18,15%) (Figura 6).

### Semanas epidemiológicas 45 a 48 - SG nas unidades sentinelas


**Identificação dos vírus respiratórios em Unidades Sentinelas de SG, entre a SE de início de sintomas 45 a 48, ES, 2025**

**Figura 7 – Vírus identificados entre a SE 45 a 48, ES, 2025 (total = 80)**



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. \*Para os dados de SG considera-se a SE de primeiros sintomas. \*\*Segundo os relatórios da Fiocruz o subtipo da influenza B circulante é o Victoria. Dados sujeitos à alteração. \*\* Se 48 – considerar atraso de digitação de notificação.

**Figura 8 - Vírus identificados na SE 48, ES, 2025 (total = 5)**



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Obs. \*Para os dados de SG considera-se a SE de primeiros sintomas. \*\*Segundo os relatórios da Fiocruz o subtipo da influenza B circulante é o Victoria. Dados sujeitos à alteração.




## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

Entre as SEs 45 e 48, observou-se a predominância do rinovírus, responsável por 35,0% dos casos. Em seguida, destacaram-se os vírus influenza (isolados ou em coinfecção), principalmente a influenza A (H3N2), com 34,0%, o SARS-CoV-2 (isolado ou associado a outros vírus), com 19,0%, o metapneumovírus (9,0%) e o parainfluenza tipo 3 (3,0%). Esses dados indicam que, nesse período, houve estabilidade na detecção do SARS-CoV-2, do rinovírus, metapneumovírus e da influenza — sobretudo o subtipo A (H3N2).

**Identificação dos vírus respiratórios em Unidades Sentinelas de SG, segundo faixa etária, entre a SE de início de sintomas 45 a 48, Espírito Santo, 2025**


**Figura 9 – Vírus identificados entre a SE 45 a 48, segundo faixa etária, ES, 2025 (total = 80)**



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. \*Para os dados de SG considera-se a SE de primeiros sintomas.

\*\*Segundo os relatórios da Fiocruz o subtipo da influenza B circulante é o Victoria. Dados sujeitos à alteração.

**Figura 10 – Vírus identificados na SE 48, segundo faixa etária, ES, 2025 (total = 5)**



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. \*Para os dados de SG considera-se a SE de primeiros sintomas.

\*\*Segundo os relatórios da Fiocruz o subtipo da influenza B circulante é o Victoria. Dados sujeitos à alteração. C. = codetecção.



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

A distribuição dos vírus respiratórios variou de forma relevante entre as diferentes faixas etárias avaliadas. Na população pediátrica, observou-se predomínio da influenza, responsável por 57,2% dos casos detectados, com destaque para o subtipo Influenza A (H3N2). O rinovírus ocupou a segunda posição, representando 42,8% dos achados.

Entre os adultos de 18 a 59 anos, o rinovírus e a influenza foram os agentes mais frequentemente identificados, cada um com 35,6%. Os demais vírus — SARS-CoV (16,9%), metapneumovírus (10,2%) e parainfluenza tipo 3 (1,7%) — apresentaram baixa detecção.

Na população idosa ( $\geq 60$  anos), o SARS-CoV se destacou como o vírus mais prevalente, identificado em 35,7% dos casos, seguido pelo rinovírus (28,6%), pela influenza (21,5%) e pelo metapneumovírus e parainfluenza tipo 3, ambos com 7,1%.

Vale destacar que as coletas de amostras e as notificações de casos de síndrome gripal (SG) nas unidades sentinelas são realizadas por amostragem, enquanto as notificações de SRAG seguem o critério de notificação universal.




## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

### VIGILÂNCIA DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

#### Panorama geral dos casos e óbitos

**Figura 11 - Distribuição dos casos de SRAG, por a SE de início de sintomas, até a SE 48, ES (total notificados = 3517 e total classificados = 3507)**




Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Excluído SRAG em investigação. \*Para os dados de SRAG considera-se a SE de primeiros sintomas. Dados sujeitos à alteração. \* Se 48 – considerar atraso de digitação de notificação. C.= codetecção



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

Figura 12 - Distribuição dos casos de SRAG, ES, 2025 até a SE 48, segundo faixa etária



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Excluído SRAG em investigação. \*Para os dados de SRAG considera-se a SE de primeiros sintomas. Dados sujeitos à alteração.

Até a Semana Epidemiológica (SE) 48, foram notificados 3517 casos hospitalizados por SRAG. Desses, a maioria foram em indivíduos de 0 a 17 anos e em idosos de 60 anos ou mais (figuras 11 e 12). Dos casos notificados, 92,04% (3237/3517) realizaram exames de diagnóstico pelo RT-PCR, a técnica padrão-ouro para a detecção de vírus respiratórios.

A análise dos resultados de diagnóstico revelou que 48,08% (1691/3517) dos casos apresentaram a identificação de vírus respiratórios. Entre esses, 10,38% (365/3517) foram positivos para influenza, 33,32% (1172/3517) para outros vírus respiratórios, como metapneumovírus, adenovírus, enterovírus, rinovírus e VSR, e 4,38% (154/3517) para SARS-CoV-2.


Por outro lado, 51,32% (1805/3517) dos casos não tiveram identificação específica de vírus respiratório. Outros 0,31% (11/3517) apresentaram outros agentes e 0,28% (10/3517) ainda estão com o diagnóstico em aberto.



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais


Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

**Figura 13 - Distribuição de óbitos de SRAG, por SE de início de sintomas, até a SE 48, ES (total = 398)**



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Obs.: Excluído SRAG em investigação. Consideram óbitos e óbitos por outras causas. \*Para os dados de SRAG considera-se a SE de primeiros sintomas. Dados sujeitos à alteração.

**Figura 14 – Distribuição dos óbitos de SRAG, ES, 2025 até a SE 48, segundo faixa etária**



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Obs.: Excluído SRAG em investigação. Consideram óbitos e óbitos por outras causas. \*Para os dados de SRAG considera-se a SE de primeiros sintomas. Dados sujeitos à alteração.

Até a SE 48, dos 3517 casos notificados, 11,32% (398/3517) foram encerrados como óbitos. Esses óbitos estão mais concentrados em idosos de mais de 60 anos. No entanto, 7,71% (271/3517) dos casos ainda estão sem desfecho (figuras 13 e 14).

Entre os óbitos, 20,60% (82/398) foram por influenza, 10,30% (41/398) por outros vírus respiratórios (VSR, rinovírus, metapneumovírus, adenovírus e enterovírus), 1,26%



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA


(5/398) por outros agentes, 11,56% (46/398) por SARS2 e 56,28% (224/398) não identificado o vírus.

Dos óbitos notificados, 82,91% (330/398) realizaram exames de diagnóstico pelo RT-PCR, a técnica padrão-ouro para a detecção de vírus respiratórios.

Cabe ressaltar que os óbitos por SARS-CoV-2 não classificados como SRAG não são inseridos no sistema SIVEP-Gripe.

### Semanas epidemiológicas 45 a 48 – casos de SRAG

**Figura 15 – Distribuição de casos de SRAG, ES, 2025 entre a SE 45 a SE 48 (total casos = 151 e total casos com identificação de vírus = 70)**



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Obs.: Excluído SRAG em investigação, não especificada (sem identificação) e por outros agentes. \*Para os dados de SRAG considera-se a SE de primeiros sintomas. Dados sujeitos à alteração. \* Se 48 – considerar atraso de digitação de notificação. C. = codetecção.



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais


Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

Nas últimas semanas, observou-se uma estabilização no número de casos SRAG, totalizando 151 registros, com predominância nos extremos de idade, ou seja, entre crianças e idosos.

Desses casos, 70 tiveram confirmação de agente viral. O rinovírus, isolado ou em associação com outros vírus, foi o mais prevalente, representando 63% das detecções. Em seguida, foram identificados isolados ou associados a outros vírus: influenza (16,0%), metapneumovírus (14%) e SARS-CoV-2 (7%).

Esses dados indicam a manutenção da circulação do rinovírus, do metapneumovírus, do SARS-CoV-2 e da influenza nas semanas mais recentes.

**Figura 16 - Distribuição de casos de SRAG, segundo faixa etária ES, entre a SE 45 a SE 48, 2025 (total casos com identificação de vírus = 70)**



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Obs.: Excluído SRAG em investigação, não especificada (sem identificação) e por outros agentes. \*Para os dados de SRAG considera-se a SE de primeiros sintomas. Dados sujeitos à alteração.

A análise da circulação viral evidenciou variações importantes entre as faixas etárias avaliadas. Entre indivíduos de 0 a 17 anos, observou-se predominância do rinovírus, responsável por 72,0% das detecções, seguido pela influenza e pelo metapneumovírus, ambos com 7,0%, e pelo SARS-CoV-2 (2,0%). Na população adulta (18 a 59 anos), o rinovírus permaneceu como o principal agente identificado, presente em 66,7% das amostras positivas, enquanto a influenza representou 33,3% das detecções. Entre idosos ( $\geq 60$  anos), destacou-se o predomínio do SARS-CoV-2, que respondeu por 31,0% das detecções, seguido pela influenza, rinovírus e metapneumovírus, cada um com 23,0%.

De forma geral, os dados evidenciam a simultânea circulação de múltiplos vírus respiratórios, com padrões distintos conforme a idade. O rinovírus predomina em crianças, adolescentes e adultos, enquanto o SARS-CoV-2 mantém impacto relevante especialmente entre idosos. A influenza apresenta circulação expressiva em todas as




## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

faixas etárias. Esses achados reforçam a necessidade de vigilância epidemiológica contínua, bem como de estratégias permanentes de vacinação e prevenção.

### Semanas epidemiológicas 45 a 48 – óbitos de SRAG

Figura 17 – Distribuição de óbitos de SRAG, ES, 2025 entre a SE 45 e SE 48 (total óbitos = 6 e total óbitos com identificação de vírus= 3)




Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Obs.: Excluído SRAG em investigação, não especificada (sem identificação) e por outros agentes. Consideram óbitos e óbitos por outras causas. \*Para os dados de SRAG considera-se a SE de primeiros sintomas. Dados sujeitos à alteração. \* Se 48– considerar atraso de digitação de notificação.



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

**Figura 18 – Distribuição de óbitos de SRAG, segundo faixa etária, ES, 2025 entre SE 45 a SE 48 (total óbitos com identificação de vírus= 3)**



Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Obs.: Excluído SRAG em investigação, não especificada (sem identificação) e por outros agentes. \*Para os dados de SRAG considera-se a SE de primeiros sintomas. Dados sujeitos à alteração.

Entre as SEs 45 e 48, foram registrados 6 óbitos, dos quais três tiveram associação confirmada com infecções por vírus respiratórios, evidenciando a continuidade do impacto desses agentes, sobretudo em grupos mais vulneráveis.

Na faixa etária pediátrica, não houve óbitos. Entre os adultos de 18 a 59 anos, foi registrado um óbito com detecção de rinovírus. Na população idosa ( $\geq 60$  anos), ocorreram dois óbitos, com confirmação laboratorial de SARS-CoV-2.

De modo geral, os óbitos registrados no período reforçam o papel contínuo dos vírus respiratórios na determinação de desfechos graves, especialmente entre crianças pequenas e idosos. Os achados ressaltam a importância da vacinação contra influenza, da vigilância laboratorial ativa e do monitoramento clínico rigoroso nos grupos de maior risco.



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

### Ações Propostas:

- **Manutenção das estratégias de vacinação**, com foco na ampliação da cobertura vacinal contra influenza, COVID-19 e demais imunobiológicos disponíveis que previnem doenças respiratórias, de forma contínua.
- **Fortalecimento das unidades sentinelas**, com vistas à reestruturação, identificação de falhas operacionais e cumprimento das metas estabelecidas.
- **Reforço das vigilâncias de influenza, COVID-19 e outros vírus respiratórios**, por meio da capacitação permanente das equipes envolvidas.
- **Manutenção regular deste informe epidemiológico**, com atualização contínua das informações e recomendações pertinentes.

### Recomendações:

- ☒ **Às vigilâncias municipais, hospitalares e aos serviços de saúde**, seja assegurada a notificação, digitação e alimentação regular dos casos de **Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)** e **Síndrome Gripal (SG)** provenientes das **unidades sentinelas** no sistema **SIVEP-Gripe**, bem como o registro dos casos de **SG suspeitos de COVID-19** no sistema **e-SUS VE**.
- ☒ **Aos profissionais e serviços de saúde**, que seja garantido o **início imediato do tratamento** dos casos suspeitos de **influenza**, **independentemente da coleta ou do resultado laboratorial**, e dos casos de **COVID-19**, conforme orientações estabelecidas no **Protocolo de Tratamento de Influenza – 2023** e no **Guia de uso do antiviral nirmatrelvir/ritonavir**.
- ☒ **Aos gestores, às vigilâncias de influenza e aos núcleos hospitalares de vigilância**, cabe **promover a ampla divulgação** do **Protocolo de Tratamento de Influenza – 2023** e do **Guia de Vigilância Integrada da COVID-19, Influenza e outros Vírus Respiratórios de Importância em Saúde Pública**, tanto nos serviços públicos quanto nos privados, com **ênfase no tratamento precoce** dos casos de **SRAG e SG** em **pessoas com condições clínicas ou fatores de risco**.
- ☒ **Aos gestores, profissionais de saúde, serviços de saúde e à população em geral**, recomenda-se **adotar e incentivar medidas de prevenção** contra a transmissão da **influenza** e da **COVID-19**, incluindo: **vacinação, etiqueta respiratória, higienização frequente das mãos, limpeza e desinfecção de objetos e ambientes, evitar locais fechados e com aglomerações, manter o isolamento em caso de sintomas gripais e buscar atendimento médico diante de sinais e sintomas compatíveis**.



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

### ANEXO 1

**Figura 19 - Distribuição dos casos e óbitos por SRAG segundo região de residência, ES, até a SE 48 (total de casos = 3517 e total de óbitos = 398)**

Regional / residência	SRAG por influenza												total casos	óbitos		
	A H1N1		A H3N2		A Não subtipado		B		c. A e outros vírus		c. B e outros vírus					
	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	óbitos				
Metropolitana	160	48	47	3	43	7	13	0	5	1	1	0	269	59		
Central	8	2	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	15	2		
Norte	31	7	3	1	6	4	1	0	0	0	0	0	41	12		
Sul	25	6	3	1	11	2	0	0	1	0	0	0	40	9		
<b>TOTAL ES</b>	<b>224</b>	<b>63</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>82</b>		

Regional / residência	SRAG por outros vírus respiratórios e outros agentes etiológicos												SRAG não especificada geração			
	VSR		c. VSR e outros vírus		Outros vírus respiratórios		Outros agentes etiológicos		COVID		c. COVID e outros vírus		casos	óbitos	casos	
	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	s	casos	óbitos	casos	óbitos				
Metropolitana	496	15	18	0	348	17	6	3	107	28	8	2	1301	109	9	0
Central	8	0	1	0	17	1	1	1	7	2	0	0	82	20	0	0
Norte	115	2	3	1	48	2	1	0	15	9	1	0	322	80	1	0
Sul	92	2	0	0	26	1	3	1	16	5	0	0	100	15	0	0
<b>TOTAL ES</b>	<b>711</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>439</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>145</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1805</b>	<b>224</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Consideram óbitos e óbitos por outras causas. Dados sujeitos à alteração. C.= codetecção

**Figura 20 - Distribuição dos casos e óbitos por SRAG segundo faixa etária, ES, até a SE 48 (total de casos = 3517 e total de óbitos = 398)**

Faixa etária	SRAG por influenza												total casos	óbitos		
	A H1N1		A H3N2		A Não subtipado		B		c. A e outros vírus		c. B e outros vírus					
	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	óbitos				
0 - 4 anos	20	1	24	1	14	0	4	0	4	0	1	0	67	2		
5 - 11 anos	9	0	6	1	2	0	5	0	0	0	0	0	22	1		
12 - 17 anos	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0		
18 - 59 anos	44	18	7	0	13	4	6	0	1	1	0	0	71	23		
> = 60 anos	148	44	16	3	35	9	0	0	1	0	0	0	200	56		
<b>TOTAL ES</b>	<b>224</b>	<b>63</b>	<b>53</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>82</b>		

Faixa etária	SRAG por outros vírus respiratórios e outros agentes etiológicos												total casos	óbitos		
	VSR		c. VSR e outros vírus		Outros vírus respiratórios		Outros agentes etiológicos		COVID		c. COVID e outros vírus					
	casos	óbitos	casos	s	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	óbitos	casos	óbitos				
0 - 4 anos	653	8	21	1	271	4	4	1	38	1	7	1	693	6	2	0
5 - 11 anos	8	0	1	0	57	0	1	0	4	0	0	0	183	0	0	0
12 - 17 anos	2	0	0	0	8	0	1	0	1	0	0	0	34	1	1	0
18 - 59 anos	12	2	0	0	32	4	3	3	28	15	1	0	260	45	3	0
> = 60 anos	36	9	0	0	71	13	2	1	74	28	1	1	635	172	4	0
<b>TOTAL ES</b>	<b>711</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>439</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>145</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1805</b>	<b>224</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Consideram óbitos e óbitos por outras causas. Dados sujeitos à alteração. C.= codetecção



## INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais

Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA

Figura 21 – Distribuição dos casos e óbitos de SRAG por influenza segundo uso do antiviral (oseltamivir), ES, até a SE 48 (total de casos = 365 e total de óbitos = 82)

Uso de antiviral (oseltamivir)	Casos	Óbitos	
Sim	197	53,70	39
<b>Não</b>	<b>167</b>	<b>46,30</b>	<b>43</b>
Em branco	1	0,00	0
	365	100,00	82
			100,00

Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE em 02 de dezembro de 2025. Dados sujeitos à alteração.

Figura 22 – Distribuição dos casos e óbitos de SRAG por influenza segundo situação vacinal, ES, até a SE 48 (total de casos = 365 e total de óbitos = 82)

SITUAÇÃO VACINAL	Casos	Óbitos	
Vacinado (campanha 2025) *	71	19,45%	13
<b>Não vacinado**</b>	<b>294</b>	<b>80,55%</b>	<b>69</b>
	365	100,00%	82
			100,00%

Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE e Vacina e confia em 02 de dezembro de 2025. Dados sujeitos à alteração. \*Considerando a ampliação para todas as idades. \*\*10 pacientes não tinham idade para vacinar (< 6 meses)

Figura 21 – Distribuição dos casos e óbitos de SRAG por COVID segundo situação vacinal, ES, até a SE 48 (total de casos = 154 e total de óbitos = 46)

SITUAÇÃO VACINAL	Casos	Óbitos	
Vacinado ou cartão em dia conforme orientação atual*	40	25,97%	5
<b>Não vacinado embora recomendado ou esquema incompleto</b>	<b>114</b>	<b>74,03%</b>	<b>41</b>
	154	100,00%	46
			100,00%

Fonte: Dados extraídos do SIVEP – GRIPE e Vacina e confia em 02 de dezembro de 2025. Dados sujeitos à alteração. \*21 - não tinham idade para se vacinar apesar de cartão em dia (< 6 meses). \*\*1 -- não tinham idade para se vacinar apesar de cartão em dia (< 6 meses)



## **INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS VIGILÂNCIAS DAS SÍNDROMES GRIPais**

**Influenza, COVID – 19 e outros vírus respiratórios - Programa Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis - Gerência em Vigilância em Saúde - SESA**

**Referência Técnica Estadual das Vigilâncias de Vírus respiratórios, Meningites e Vigilância de Eventos Supostamente Atribuíveis a Vacinação ou Imunização**

Elisa Citty Duccini

**Referência Técnica Estadual das Vigilâncias de Vírus respiratórios, Meningites e das Doenças Exantemáticas**

Dayana Kelli Fonseca

**Referência Técnica Estadual das Vigilâncias de Vírus respiratórios e das Meningites**

Mariana Ribeiro Macedo

**Referência Técnica do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis**

Danielle Grillo Pacheco Lyra

Gerente de Vigilância

Juliano Mosa Mação

**Subsecretaria de Vigilância em Saúde**

Orlei Amaral Cardoso