



NOTA INFORMATIVA Nº 09/2022 – SESA/SSVS/GEVS/PEI

Vitória, 23 de março de 2022.

Orientações sobre os esquemas das vacinas Covid-19.

Diante das atualizações do Ministério da Saúde e das Resoluções CIB do estado do Espírito Santo, seguem os esquemas das vacinas Covid-19 adotados no estado.

Pessoas da população geral de 18 a 59 anos de idade, não gestantes ou puérperas				
D1	D2		Reforço	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	4 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer. Em caso de recusa explícita dos usuários ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do esquema homólogo.
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	4 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	4 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.
D (dose)	D2	Imunizante	Reforço	Imunizante
Janssen	Não indicada	Não se aplica	4 meses após D	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.

Gestantes ou puérperas a partir de 18 de idade.				
D1	D2		Reforço	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.

*Vacinas de vetor viral (AstraZeneca e Janssen) não são recomendadas para gestantes e puérperas.

Pessoas imunocomprometidas de 18 a 59 anos de idade, não gestantes ou puérperas						
D1	D2		Dose adicional		Reforço	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer. Em caso de recusa explícita dos usuários ao esquema heterólogo,



						fica autorizada aplicação do esquema homólogo.
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.
D (dose)	D2	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Janssen	Não indicada	Não se aplica	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.

Pessoas da população geral idosas acima de 60 anos de idade						
D1	D2		Reforço		2º Reforço (4ª dose)	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	3 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer. Em caso de recusa explícita dos usuários ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do esquema homólogo.	3 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer. Em caso de recusa explícita dos usuários ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do esquema homólogo.
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	3 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.	3 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	3 meses após D2	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.	3 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.
D (dose)	D2	Imunizante	Reforço	Imunizante	Reforço	Imunizante
Janssen	Não indicada	Não se aplica	3 meses após D	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.	3 meses após REF	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.



Pessoas <u>imunocomprometidas</u> idosas acima de 60 anos de idade						
D1	D2		Dose adicional		Reforço	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	3 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer. Em caso de recusa explícita dos usuários ao esquema heterólogo, fica autorizada aplicação do esquema homólogo.
Astrazeneca	8 semanas após D1	AstraZeneca ou Pfizer	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	3 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	3 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.
D (dose)	D2	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Janssen	Não indicada	Não se aplica	8 semanas após D	Mesmo imunizante do esquema primário.	3 meses após dose adicional	AstraZeneca, Janssen ou Pfizer.

Gestantes ou puérperas <u>imunocomprometidas</u> a partir de 18 de idade.						
D1	D2		Dose adicional		Reforço	
	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	Coronavac	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.
Pfizer	8 semanas após D1	Pfizer	8 semanas após D2	Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após D2	Preferencialmente Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.

*Vacinas de vetor viral (AstraZeneca e Janssen) não são recomendadas para gestantes e puérperas.

Adolescentes de 12 a 17 anos de idade		
D1	D2	Reforço
Coronavac	28 dias após D1 com Coronavac.	Não indicado.
Pfizer	8 semanas após D1 com Pfizer.	Não indicado.

Adolescentes de 12 a 17 anos de idade que sejam gestantes e puérperas		
D1	D2	Reforço
Coronavac	28 dias após D1 com Coronavac.	A partir de 4 meses após a D2 preferencialmente com Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.
Pfizer	8 semanas após D1 com Pfizer.	A partir de 4 meses após a D2 preferencialmente com Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.

Adolescentes de 12 a 17 anos de idade <u>imunocomprometidos</u>, incluindo gestantes e puérperas			
D1	D2	Dose adicional	Reforço
Pfizer	8 semanas após D1 com Pfizer.	8 semanas após D2	A partir de 4 meses após a Dose adicional com Pfizer.

Crianças de 6 a 11 anos de idade		
D1	D2	Reforço
Coronavac	28 dias após D1 com Coronavac.	Não indicado.
Crianças de 5 a 11 anos de idade e aquelas <u>imunocomprometidas</u>		
Pfizer pediátrica	8 semanas após D1 com Pfizer pediátrica	Não indicado.

Ressaltamos a importância de intensificação das estratégias de vacinação para o alcance do público alvo da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 e das parcerias com as escolas públicas e privadas para melhoria das coberturas vacinais das crianças e adolescentes.

A Equipe do Programa Estadual de Imunizações se coloca à disposição para as orientações relativas às diretrizes para a operacionalização da campanha de vacinação contra a covid- 19 e outros esclarecimentos, fone: (27) 3636-8424/8425, e-mail imunizacao@saude.es.gov.br.

Esta Nota substitui a Nota Informativa nº 04/2022 – SESA/SSVS/GEVS/PEI.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NESIS - SESA - GOVES
assinado em 26/03/2022 22:38:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/03/2022 22:38:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DANIELLE GRILLO PACHECO LYRA (CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04 - NESIS - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-QW1PTG>