CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

ESQUEMA DE VACINAÇÃO DE ROTINA DA CRIANÇA INDÍGENA - 0 a 10 anos

Versão: AGOSTO/2026

VACINA	PROTEÇÃO CONTRA	COMPOSIÇÃO	Nº DE DOSES		ESQUEMA VACINAL	INÍCIO DA VACINAÇÃO		INTERVALO ENTRE AS DOSES		DOSAGEM	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	LOCAL DE APLICAÇÃO	AGULHA HIPODÉRMICA RECOMENDADA	TEMPO DE VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO	PRINCIPAIS EVENTOS ADVERSOS
			VACINAÇÃO BÁSICA	REVACINAÇÃO OU REFORÇO		MÍNIMA	MÁXIMA	RECOMENDADO	MÍNIMO						
BCG	Formas graves da Tuberculose	Bactéria viva atenuada	Dose única	-	Ao nascer	Ao nascer	4 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	FAP: 0,1 ml Serum: Menor de 1 ano: 0,05 ml Maior de 1 ano: 0,1ml	Intradérmica (ID)	Inserção inferior do músculo deltóide direito	13x3,8	6 horas (multidose)	Reações locais e/ou regionais, granuloma, úlcera >1cm, abscesso quente, abscesso frio, linfadenopatias supurada e não supurada regionais, queloide
HEPATITE B (HB) Recombinante	Hepatite B	Partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície	Dose	-	Ao nascer	Ao nascer	30 dias	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa	20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)	Butantan: 15 dias - Butantan/ LG: 10 dias- Serum: 28 dias- LG 28 dias	Dor, enduração, rubor, abscessos locais e manifestações sistêmicas
POLIOMIELITE 1, 2 E 3 (VIP inativada)	Poliomielite	Vírus inativado tipos 1, 2 e 3	3 doses	1º Ref 15 meses 2º Ref 4 anos	D1: 2 meses D2: 4 meses D3: 6 meses Ref. 15 meses e 4 anos	2 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	Esquema primário: 60 dias.	Esquema primário: 30 dias. D3 para Reforço: 6 meses; Entre 1º e 2º reforço: 6 meses.	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa	20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)	28 dias	Eritema, enduração, dor, febre moderada, reação de hipersensibilidade (rara).
ROTAVÍRUS HUMANO G1P1 (VORH)	Gastroenterite por Rotavírus	Vírus vivo atenuado	2 doses	-	D1: 2 meses D2: 4 meses	1ª dose: 1 mês e 15 dias 2ª dose: 3 meses e 15dias	1ª dose: 11 meses e 29 dias; 2ª dose: 23 meses e 29 dias	60 dias	30 dias	1,5 ml	Oral	Cavidade oral	-	Uso imediato	Irritabilidade, vômito e diarréia moderados. Invaginação intestinal
DTP+Hib+HB (Penta)	Difteria, Tétano, Coqueluche, Infecções por Haemophilus Influenzae b, Hepatite B	Toxoides diftérico e tetânico, células inteiras inativadas de Bordetella pertussis, antígeno de superfície da hepatite B e oligossacarídeos conjugados de Haemophilus influenzae b	3 doses	-	D1: 2 meses D2: 4 meses D3: 6 meses	2 meses	6 anos, 11 meses e 29 dias	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa	20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)	Novartis, Serum, Panacea Biotec: Uso imediato após preparo. Biological: 28 dias	Reações locais, dor, abscessos frio e/ou quente, febre, sonolência, vômito, irritabilidade, choro persistente, EHH, convulsão e reações de hipersensibilidade
PNEUMOCÓCICA 20 VALENTE (Pncc 20)	Pneumonias, meningites, otites, sinusites pelos sorotipos que compõem a vacina	Polissacarídeo capsular de 20 sorotipos do pneumococo (conjugada)	1 dose	12 meses	D1: 2 meses REF. 12 meses	2 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	Esquema básico: 60 dias	Esquema básico: 30 dias, D2 com a Pnm10 e 60 dias para Reforço com a Pnm20	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa	20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)	Uso imediato	Reações locais, febre, irritabilidade, sonolência, perda de apetite, reações de hipersensibilidade

PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE (Pncc 10)	Pneumonias, meningites, otites, sinusites pelos sorotipos que compõem a vacina	Polissacarídeo capsular de 10 sorotipos do pneumococo (conjugada)	1 dose	12 meses com a Pnm20	D2: 4 meses	4 meses	11 meses e 29 dias	Esquema básico: 60 dias	Esquema básico: 60 dias para Reforço com a Pnm20	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa	20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)	Fiocruz: 28 dias Bio-manguinhos: uso imediato	Reações locais, febre, irritabilidade, sonolência, perda de apetite, reações de hipersensibilidade
MENINGOCÓCICA C Conjugada (MncC)	Doença sistêmica causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C	Oligossacarídeo conjugado com a proteína CRM 197 de Corynebacterium diphteriae	2 doses	-	D1: 3 meses D2: 5 meses	3 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	Esquema básico: 60 dias	Esquema básico: 30 dias, D2 para Ref com meningo ACWY: 60 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa	20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)	Uso imediato após preparo	Reações locais, febre, irritabilidade, sonolência, cefaléia, diarréia e vômito
[1] [2]COVID-19: Pfizer pediátrica para menor de 5 anos	Prevenção das complicações causadas pela COVID-19	RNA mensageiro	3 dose	Reforço anual	D1, D2 e D3	6 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	D1 para D2: 4 semanas e D2 para D3: 8 semanas	-	0,2 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa ou região deltoideana, à depender da idade	20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos) 13x4,5	12 horas após diluição	Reações locais, febre, mal estar, mialgia e reações de hipersensibilidade
INFLUENZA	Prevenção das complicações causadas pelo virus influenza	Cepas do *Myxovirus influenzae* inativados, fragmentados e purificados	D1 e D2 (primovacinados menores de 9 anos); Vacinados anteriormente: reforço anual	Reforço anual	D1: 6 meses D2: 7 meses Reforço anual	6 meses	Sem limite de idade	30 dias entre D1 e D2	30 dias	De 6 meses a menores de 3 anos: 0,25ml Acima de 3 anos: 0,5ml	Intramuscular (IM)	Menor de 2 anos: Vasto lateral da coxa	20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)	7 dias	Reações locais. Vômito, diarréia, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, febre.
FEBRE AMARELA (FA)	Febre Amarela	Vírus vivo atenuado	2 doses	-	D1: 9 meses Ref: 4 anos	9 meses	-	-	-	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região Deltoideana	13x4,5	Fiocruz: 6 horas (multidose)	Reações locais, febre, mialgia, cefaléia, doença viscerotrópica aguda, doença neurológica aguda.
SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA (SCR)	Sarampo, Caxumba e Rubéola	Vírus vivo atenuado	2 doses	-	D1: 12 meses D2: 15 meses	12 meses	59 anos, 11 meses e 29 dias	3 meses	30 dias	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região Deltoideana	13x4,5	Serum: 6h Fiocruz e MSD: 8h	Reações locais, febre, cefaléia, exantema, linfadenopatia, encefalite, meningites, artralgia, artrite, púrpura trombocitopênica, parotidite, reações de hipersensibilidade, dentre outras.
MENINGOCÓCICA ACWY Conjugada (MenACWY)	Doenças invasivas causadas pela Neisseria meningitidis dos sorogrupos A,C,W e Y.	Polissacarídeo concentrado de Neisseria meningitidis Sorogrupo A, C, W e Y Conjugado	-	Reforço	Reforço aos 12 meses de idade	12 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)	Uso imediato após preparo	Reações locais: dor, hiperemia, edema. Reações sistêmicas: febre, irritabilidade, sonolência, hiporexia, reações de hierpensibilidade dentre outras.
HEPATITE A (HA)	Hepatite A	Antígeno do vírus da hepatite A	Dose única	-	DU: 15 meses	15 meses	4 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa	20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)	Uso imediato após preparo	Reações locais, febre, diarréia, vômito e fadiga

DIFTERIA, TÉTANO, PERTUSSIS (DTP)	Difteria, Tétano e Coqueluche	Toxoides diftérico e tetânico, células inteiras inativadas de Bordetella pertussis	-	1º Ref 15 meses 2º Ref 4 anos	1º Ref 15 meses 2º Ref 4 anos	15 meses	6 anos, 11 meses e 29 dias	1º ref aos 15 meses 2º ref aos 4 anos	1º ref 6 meses após 3ª dose, 2º ref 6 meses após 1º ref	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Vasto lateral da coxa ou deltóide	20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (acima de 2 anos)	Butantan: 15 dias - Serum e Biological: 28 dias - Biofarma: 4 semanas	Reações locais, febre, sonolência, vômito, irritabilidade, choro persistente, EHH, convulsão e reações de hipersensibilidade
[3]VARICELA	Varicela	Vírus vivo atenuado	2 doses	-	D1: 15 meses D2: 4 anos	9 meses	6 anos, 11 meses e 29 dias	< 12 anos: 3 meses entre D1/ D2 > 13 anos: 8 sem entre D1/D2	> 13 anos: mínimo de 4 sem entre D1/D2	0,5 ml	Subcutânea (SC)	Região Deltoideana	13x4,5	Uso imediato	Reações locais, febre, encefalite, ataxia, reações de hipersensibilidade
PNEUMOCÓCICA 23 VALENTE (Pneumo 23)	Infecções invasivas pelo pneumococo nas populações indígenas	Polissacarídeo capsular de 23 sorotipos do pneumococo (conjugada)	2 doses para população indígena **acima de 5 anos de idade sem comprovação vacinal com as vacinas pneumocócicas conjugadas**	-	D1: somente para população indígena acima de 5 anos de idade **sem comprovação vacinal com as vacinas pneumocócicas conjugadas**	5 anos	-	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 ou 25x7	Uso imediato	Febre (<38,9ºC) e reações no local da injeção consistindo de dor, eritema, calor, inflamação e endurecimento local
DIFTERIA, TÉTANO (dT)	Difteria e Tétano	Toxoides diftérico e tetânico	Considerar doses anteriores do componente diftérico e tetânico (3 doses)	A cada 10 anos, 5 anos em caso de ferimentos graves	D1, D2, D3 ou Ref	7 anos	Sem limite de idade	60 dias	30 dias	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 ou 25x7	Butantan:15 dias - Serum/Intervax/Biological/ Biofarma: 4 semanas	Reações locais, nódulos, febre, cefaléia, sonolência, vômito e linfanodomegalia, reações de hipersensibilidade e manifestações neurológicas.
HPV	Câncer de colo de útero, garganta, boca, pênis e ânus	Proteína L1 do HPV 6, 11, 16 e 18 Engenharia genética	Dose única	-	Dose única	9 anos	14 anos, 11 meses e 29 dias	-	-	0,5 ml	Intramuscular (IM)	Região Deltoideana	25x6 ou 25x7	Uso imediato	Reações locais, cefaléia, febre, síncope, reações de hipersensibilidade

[1]**Covid-19:** Crianças de 6m, a 4a, 11m e 29d de idade com comorbidades, com deficiência permanente, quilombolas, indígenas e ribeirinhas que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber uma dose anual da vacina atualizada.

[2]**Covid-19:** Crianças de 6m, a 4a, 11m e 29d de idade imunocomprometidas que receberam o esquema completo de vacinas covid-19 deverão receber duas doses da vacina atualizada, com intervalo mínimo de seis meses entre as doses.

[3]**Vacina Varicela:** Indígenas a partir dos 7 (sete) anos de idade não vacinados ou sem comprovação vacinal ou sem história pregressa da doença, administrar 1 (uma) ou duas doses de vacina varicela (atenuada), a depender do laboratório produtor.